

## Sadržaj

1 Matematičko očekivanje diskretne slučajne varijable	1
2 Zadaci	2
3 Čebiševljeva nejednakost	4
4 Funkcija izvodnice diskretne slučajne varijable	4
5 Zadaci	4

### 1 Matematičko očekivanje diskretne slučajne varijable

Matematičko očekivanje diskretne slučajne varijable

**Definicija 1.**

Neka je  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$  diskretan vjerojatnosni prostor i  $X$  slučajna varijabla na njemu. Ako red

$$\sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\})$$

apsolutno konvergira, tj. ako konvergira red  $\sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)|P(\{\omega\})$ , onda kažemo da slučajna varijabla  $X$  ima matematičko očekivanje i broj

$$EX = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\})$$

zovemo matematičko očekivanje slučajne varijable  $X$ .

**Teorem 1.**

Neka je  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$  diskretan vjerojatnosni prostor i

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

slučajna varijabla na njemu. Redovi

$$\sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\}) \quad \text{i} \quad \sum_{i \in \mathbb{N}} x_i p_i$$

istovremeno ili apsolutno konvergiraju ili apsolutno divergiraju. U slučaju apsolutne konvergencije sume su im jednake i vrijedi

$$EX = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\}) = \sum_{i \in \mathbb{N}} x_i p_i.$$

**Definicija 2.**

Neka je  $X$  slučajna varijabla na diskretnom vjerojatnosnom prostoru  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$  i  $r > 0$ . Definiramo sljedeće momente slučajne varijable  $X$ :

1.  $r$ -ti moment:

$$E[X^r] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^r p_i,$$

ako  $E[X^r]$  postoji,

2.  $r$ -ti centralni moment:

$$m_r = E[(X - E[X])^r],$$

ako  $E[(X - E[X])^r]$  postoji,

3.  $r$ -ti apsolutni moment:

$$E[|X|^r] = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^r p_i,$$

ako  $E[|X|^r]$  postoji.

### Definicija 3.

Drugi centralni moment zove se **varijanca** slučajne varijable  $X$ :

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2.$$

### Napomena 1.

Neka su  $X$  i  $Y$  slučajne varijable koje imaju matematičko očekivanje, tj.  $E[X]$  i  $E[Y]$  postoje. Matematičko očekivanje ima sljedeća bitna svojstva:

1. linearnost:  $E[\alpha X + \beta Y] = \alpha E[X] + \beta E[Y]$ ,
2. monotonost:  $X \leq Y \Rightarrow E[X] \leq E[Y]$ ,
3.  $X \geq 0 \Rightarrow E[X] \geq 0$ ,
4.  $X \geq 0$  i  $E[X] = 0 \Rightarrow X = 0$ .

## 2 Zadaci

### Zadatak 1.

Odredite matematička očekivanja slučajnih varijabli  $X$ ,  $X^2$  i  $X^3$ , gdje je slučajna varijabla  $X$  zadana je sljedećom tablicom distribucije:

a)

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/16 & 1/16 \end{pmatrix}.$$

b)

$$X = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/16 & 1/16 \end{pmatrix}.$$

### Zadatak 2.

Slučajna varijabla  $X$  zadana je tablicom distribucije

$$X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 3 & 4 & 8 \\ a & 1/8 & a - b^2 & b^2 & 1/4 & b \end{pmatrix},$$

gdje su  $a$  i  $b$  nepoznati parametri. Ako  $E[X] = 25/8$ , odredite:

- (a) vrijednosti parametara  $a$  i  $b$ ,

(b) varijancu slučajne varijable  $X$ .

**Zadatak 3.**

Za zadatke s prethodnih vježbi (vježbe 6) odredite sljedeća matematička očekivanja:

a) Zadatak 4 -  $E[X]$ , gdje je

$$X(\{i, j, k\}) = \max\{i, j, k\}, \quad i, j, k \in \{1, \dots, 7\}.$$

b)  $E[X]$ , gdje je  $X$  slučajna varijabla čija je realizacija broj semafora pored kojih automobil prođe prije zaustavljanja na prvom crvenom svjetlu,

c)  $E[Y]$ , gdje je  $Y = 3X^2 - 3$ ,

d)  $E[Y]$ , gdje je  $Y = 3 - 2 \cos^2 X$ .

**Zadatak 4.**

Ispitujemo ispravnost sustava koji se sastoji od tri komponente. Otkazivanje komponenti događa se nezavisno i vjerojatnost otkazivanja  $n$ -te komponente je

$$p_n = 0.2 + (n-1)0.1, \quad n \in \{1, 2, 3\}.$$

Odredite distribuciju, matematičko očekivanje i varijancu slučajne varijable kojom je modeliran broj komponenti koje su otkazale.

**Zadatak 5.**

U spremniku se nalazi pet kutija: dvije su prazne, a u preostale tri nalazi se po deset bombona. Izvlačimo jednu po jednu kutiju sve dok ne izvučemo praznu kutiju (izvlačenje se vrši bez vraćanja prethodno izvučenih kutija u spremnik). Kolika je vjerojatnost da izvučemo svih 30 bombona? Odredite distribuciju, matematičko očekivanje i varijancu slučajne varijable kojom je modeliran broj bombona koje smo izvukli.

**Zadatak 6.**

Diskretna slučajna varijabla zadana je tablicom distribucije

$$X = \begin{pmatrix} 1-\alpha & 1 & 1+\alpha \\ p & 2p & 3p \end{pmatrix}, \quad \alpha > 0.$$

a) Odredite vrijednost parametra  $p$ .

b) Izračunajte matematičko očekivanje, varijancu i treći apsolutni moment slučajne varijable  $X$ .

c) Izračunajte

$$P\left(|X| \leq 1 + \frac{\alpha}{2}\right).$$

### 3 Čebiševljeva nejednakost

**Propozicija 1.**

(Čebiševljeva nejednakost) Neka je  $X$  slučajna varijabla koja ima varijancu  $\sigma^2$  i neka je  $k > 0$ . Tada vrijedi:

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2},$$

gdje je  $\mu$  očekivanje slučajne varijable  $X$ .

**Napomena 2.**

Primjenom svojstva vjerojatnosti suprotnog događaja slijedi:

$$P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

### 4 Funkcija izvodnice diskretne slučajne varijable

**Funkcija izvodnice diskretne slučajne varijable**

**Definicija 4.**

Neka je  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$  diskretan vjerojatnosni prostor i  $X$  slučajna varijabla na njemu sa slikom  $\mathcal{R}(X) \subseteq \mathbb{N}_0$ . Funkciju izvodnicu (vjerojatnosti) slučajne varijable  $X$  definiramo s

$$g_X(z) := E[z^X] = \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k)z^k$$

**Napomena 3.**

- Red  $\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k)z^k$  kojim je definirana funkcija izvodnice konvergira za  $-1 \leq z \leq 1$ .
- $E[X] = g'_X(1)$
- $Var(X) = g''_X(1) + g'_X(1) - g'_X(1)^2$

### 5 Zadaci

**Zadatak 7.**

Automat za igre na sreću u nekoj kockarnici programiran je tako da se prirodan broj  $n$  realizira s vjerojatnošću  $2^{-n}$ , tj.

$$P(X = n) = \frac{1}{2^n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

- a) Odredite distribuciju, matematičko očekivanje i varijancu slučajne varijable kojom je modeliran prirodan broj generiran automatom.
- b) Izračunajte vjerojatnost da realizacija slučajne varijable  $X$  od njenog očekivanja odstupa za barem dvije standardne devijacije.

- c) Vjerojatnost izračunatu u zadatku b) ocijenite pomoću Čebiševljeve nejednakosti te usporedite rezultate.

**Zadatak 8.**

Neka je  $X$  slučajna varijabla kojom je modeliran broj kišnih dana u Osijeku tijekom jedne godine. Poznato je da je očekivani broj kišnih dana 128, a standardna devijacija 4. Ocijenite vjerojatnost da broj kišnih dana u Osijeku tijekom jedne godine odstupa od očekivanog broja za manje od pet dana.

**Zadatak 9.**

Neka je  $X$  slučajna varijabla kojom je modelirana visina snježnog pokrivača na Zavižanu u dvanaestom mjesecu. Poznato je da je očekivana visina snijega u prosincu na Zavižanu 75 cm, a standardna devijacija 12 cm. Kolika se visina snijega može očekivati tijekom prosinca ako Čebiševljeva ocjena vjerojatnosti nije manja od 0.9.