

UVOD U TEORIJU BROJEVA

Ivan Matić

Osijek, 2013.

Sadržaj

1 DJELJIVOST	4
1.1 Osnovni pojmovi	4
1.2 Euklidov algoritam	6
1.3 Verižni razlomci	9
1.4 Prosti brojevi	11
1.4.1 Osnovni teorem aritmetike	11
1.4.2 Skup prostih brojeva	12
1.4.3 Broj djelitelja i suma djelitelja prirodnog broja	13
1.4.4 Fermatovi i Mersennovi brojevi	14
2 KONGRUENCIJE	18
2.1 Definicija i osnovna svojstva	18
2.1.1 Potpuni i reducirani sustavi ostataka	20
2.2 Eulerova funkcija	22
2.3 Wilsonov i Lagrangeov teorem	24
2.4 Pseudoprosti i Carmichaelovi brojevi	26
3 PRIMJENA KONGRUENCIJA	30
3.1 Linearne diofantske jednadžbe	30
3.2 Kriptosustavi	32
3.3 RSA kriptosustav	35
4 KVADRATNI OSTATCI	38
4.1 Legendreov simbol	38
4.2 Kvadratni zakon reciprociteta	41
4.3 Jacobijev simbol	44
4.4 Primjena kvadratnih ostataka na diofantske jednadžbe	44
5 GAUSSOVI CIJELI BROJEVI	47
5.1 Skup $\mathbb{Z}[i]$	47
5.2 Djeljivost i prosti elementi u $\mathbb{Z}[i]$	48
5.3 Prikazi prirodnih brojeva u obliku sume dvaju kvadrata	51
5.4 Pitagorine trojke	52

6 PELLOVE JEDNADŽBE	55
6.1 Osnovni pojmovi i egzistencija rješenja	56
6.2 Struktura skupa rješenja Pellove jednadžbe	58
6.3 Određivanje rješenja Pellove jednadžbe	59

Poglavlje 1

DJELJIVOST

Engleski matematičar Godfrey Harold Hardy je u svom djelu *Isprika jednog matematičara* (*A Mathematician's Apology*), objavljenom 1940., istaknuo kako smatra da je najljepša matematika upravo čista, teorijska matematika, koja je lišena mogućnosti praktične primjene, u čemo, kako je naglasio, prednjači upravo jedno od njegovih polja istraživanja - teorija brojeva (kako ćemo vidjeti kroz nekoliko poglavlja, ubrzo se pokazalo da Hardy nije u pravu). Pri tome se Hardy snažno oslanja i na Gaussovnu izjavu prema kojoj je "matematika kraljica znanosti, a teorija brojeva kraljica matematike". Iako je prema nekima upravo neprimjenjivost teorije brojeva glavni oslonac Gaussu pri ovoj izjavi, Hardy je jasno istaknuo kako se protivi takvom razmišljanju, jer pronalazak primjene teorije brojeva zasigurno ne bi rezultirao detroniziranjem statura ove grane teorijske matematike. Hardy smatra kako se ishodište Gaussova stava, pri čemu se s njim u potpunosti slaže, očituje u činjenici da su temeljni pojmovi i koncepti teorije brojeva mnogo čišći, dublji i elegantniji od istih u drugim granama matematike. Među glavne oslonce te teze pripada i pojam djeljivosti.

1.1 Osnovni pojmovi

Djeljivost je fundamentalni pojam teorije brojeva. Dakle, neka su a, b cijeli brojevi, te neka je $a \neq 0$. Kažemo da a dijeli b ako postoji cijeli broj d takav da vrijedi $b = a \cdot d$. U tom slučaju pišemo $a | b$, broj b nazivamo višekratnikom broja a , dok broj a nazivamo djeliteljem broja b .

Ukoliko a ne dijeli b , pišemo $a \nmid b$. Pogledajmo nekoliko primjera:

Primjer 1.

Kako je $4 = 2 \cdot 2$, očito $2 | 4$. Također, $2 | -6$, jer je $-6 = -3 \cdot 2$. No, $2 \nmid -7$.

Primijetimo kako $a | 0$, $\forall a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, jer je $0 = 0 \cdot a$. Slično, $1 | b$, $\forall b \in \mathbb{Z}$. S druge strane, iz $a | 1$ slijedi $a \in \{1, -1\}$.

Navedimo nekoliko osnovnih svojstava djeljivosti:

Propozicija 1.1.1. (1) Ako $a \mid b$ i $b \neq 0$, tada je $|a| \leq |b|$.

(2) Ako je a djelitelj broja b , tada je a djelitelj i svakog višekratnika od b .

(3) Ako je a djelitelj brojeva b i c , tada je djelitelj i brojeva $b+c$, $b-c$ i $b \cdot c$.

Dokaz. (1) Neka je $b = a \cdot d$. Odatle slijedi $|b| = |a| \cdot |d|$. Kako je $b \neq 0$, očito je $|d| \geq 1$ iz čega slijedi tvrdnja.

(2) Neka je $b = a \cdot d_1$ te neka je c višekratnik broja b . Prema tome, postoji neki cijeli broj d_2 takav da je $c = b \cdot d_2 = a \cdot d_1 \cdot d_2$. Prema tome, $a \mid c$.

(3) Neka je $b = a \cdot d_1$ te $c = a \cdot d_2$. Redom dobivamo $b \pm c = a \cdot (d_1 \pm d_2)$ i $b \cdot c = a^2 \cdot (d_1 \cdot d_2)$ što povlači tvrdnju. \square

Primijetimo kako iz tvrdnje (1) prethodne propozicije slijedi da ukoliko $a \mid b$ i $b \mid a$, tada je $a \in \{b, -b\}$.

Sada ćemo pokazati jedan od osnovnih teorema čitave teorije brojeva, poznat pod nazivom *Teorem o dijeljenju s ostatkom*.

Teorem 1.1.2. Neka su a, b cijeli brojevi, $a > 0$. Tada postoji jedinstveni cijeli brojevi q i r takvi da je $b = q \cdot a + r$, pri čemu je $0 \leq r < a$.

Dokaz. Dokažimo najprije da postoje brojevi q i r kao u iskazu teorema. U tu svrhu, promotrimo racionalan broj $\frac{b}{a}$. Neka je q cijeli broj takav da $\frac{b}{a}$ leži u poluotvorenom intervalu $[q, q+1)$. Očito vrijedi $0 \leq \frac{b}{a} - q < 1$.

Stavimo $r = b - a \cdot q = a(\frac{b}{a} - q)$ (primijetimo da je r cijeli broj koji zadovoljava $b = q \cdot a + r$). Iz prethodne nejednakosti slijedi $0 \leq r < a$.

Dokažimo sada i jedinstvenost. Dakle, neka su $b = q_1 \cdot a + r_1$ i $b = q_2 \cdot a + r_2$ dva rastava traženog oblika, tj. $q_1, q_2, r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$ te $0 \leq r_1, r_2 < a$.

Oduzimanjem dobivamo $a(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$. Ako je $q_1 \neq q_2$, tada a dijeli $r_2 - r_1$. No, $-a + 1 \leq r_2 - r_1 \leq a - 1$ te je $|r_2 - r_1| < a$. Prema prvom dijelu Propozicije 1.1.1 slijedi $q_1 = q_2$. No, tada je i $r_1 = r_2$ čime je teorem dokazan. \square

U prethodnom teoremu se broj r naziva ostatak pri dijeljenju, dok je q kvocijent cjelobrojnog dijeljenja.

Za realan broj x stavimo $\lfloor x \rfloor =$ najveći cijeli broj koji nije veći od x . Time smo definirali cjelobrojnu funkciju 'pod' (ili, funkciju najveće cijelo). Npr. $\lfloor 3.4 \rfloor = 3$, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$, $\lfloor n \rfloor = n$ za $n \in \mathbb{Z}$. Tada se kvocijent cjelobrojnog dijeljenja q može zapisati u obliku $q = \lfloor \frac{b}{a} \rfloor$.

Primjer 2. $100 = 32 \cdot 3 + 4$, $\lfloor \frac{100}{32} \rfloor = 3$. Također, $100 = 3 \cdot 33 + 1$, $\lfloor \frac{100}{3} \rfloor = 33$.

Neka su b i c cijeli brojevi. Cijeli broj a koji dijeli oba broja b i c se naziva zajednički djelitelj brojeva b i c . Ukoliko je barem jedan od brojeva b i c različit od nule, tada taj broj ima konačno mnogo djelitelja. U tom slučaju postoji i konačno mnogo zajedničkih djelitelja brojeva b i c . Najvećeg od njih označavamo s (b, c) . Izraz (b, c) nazivamo *najveći zajednički djelitelj brojeva b i c* .

Slično se definira i najveći zajednički djelitelj cijelih brojeva b_1, b_2, \dots, b_n (od kojih je barem jedan različit od nule), koji se označava s (b_1, b_2, \dots, b_n) .

Primijetimo da je (b, c) uvijek prirodan broj.

Primjer 3. $(100, 17) = 1$, $(24, 16) = 8$, $(a, a \cdot b) = |a|$, za $a \neq 0$.

Za cijele brojeve a i b kažemo da su *relativno prosti* ukoliko je $(a, b) = 1$. Brojevi 100 i 17 iz prethodnog primjera su relativno prosti. Slično, za brojeve b_1, b_2, \dots, b_n kažemo da su relativno prosti ukoliko je $(b_1, b_2, \dots, b_n) = 1$.

Naravno, postavlja se pitanje kako odrediti najveći zajednički djelitelj danih cijelih brojeva. Ukoliko se radi o većim brojevima (pa već i troznamenkastim), takav zadatak postaje vrlo težak. Efikasan postupak ćemo opisati u idućem poglavlju.

1.2 Euklidov algoritam

Promotrimo najprije idući primjer.

Primjer 4. Odredite $(70, 32)$.

Prema dijelu (3) Propozicije 1.1.1, svaki zajednički djelitelj brojeva 70 i 32 dijeli i njihovu razliku. Prema tome, $(70, 32) \mid 70 - 32 = 38$. Dakle, $(70, 32)$ je i zajednički djelitelj brojeva 32 i 38. No, kako je svaki zajednički djelitelj brojeva 32 i 38 ujedno i djelitelj broja 70, dobivamo jednakost $(70, 32) = (38, 32)$.

Na sličan način možemo vidjeti i $(70, 32) \mid 70 - 2 \cdot 32 = 6$. Time smo problem određivanja broja $(70, 32)$ sveli na problem određivanja broja $(32, 6)$, koji je očito jednak 2; što se može dobiti i sličnim zaključivanjem kao ranije, tj. $(32, 6) \mid 32 - 5 \cdot 6 = 2$, odakle je $(70, 32) = (6, 32) = (6, 2) = 2$.

Općenito, neka su a i b cijeli brojevi te neka samo uzastopnom primjenom Teorema 1.1.2 dobili sljedeći niz jednakosti:

$$\begin{aligned} b &= q_1 a + r_1 \\ a &= q_2 r_1 + r_2 \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3 \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + 0 \end{aligned}$$

(postupak završava kada dobijemo ostatak jednak nuli). Kako je $a > r_1 > r_2 > \dots$ čitav postupak završava nakon konačno mnogo koraka.

Iz prve jednakosti slijedi $(a, b) \mid r_1$ te da je svaki zajednički djelitelj brojeva a i r_1 ujedno i djelitelj broja b . Prema tome, $(a, b) = (a, r_1)$. Na isti način dobivamo i niz jednakosti $(a, b) = (a, r_1) = (r_1, r_2) = \dots = (r_{n-1}, r_n) = r_n$, jer r_n dijeli r_{n-1} . Prema tome, (a, b) jednak je posljednjem nenul ostatku. Opisani postupak određivanja najvećeg zajedničkog djelitelja se naziva *Euklidov algoritam*. Ovaj drevni algoritam predstavlja izuzetno efikasan način za određivanje najvećeg zajedničkog djelitelja dvaju cijelih brojeva, s brojnim važnim posljedicama. Napomenimo kako se otkriće Euklidova algoritma danas prvenstveno pripisuje Pitagorejcima, dok ga je Euklid objavio u svojim *Elementima*. Također, poznato je da su isti algoritam koristili još i indijski te kineski matematičari.

Primjer 5. Odrediti $(172, 50)$.

$$\begin{aligned} 172 &= 3 \cdot 50 + 22 \\ 50 &= 2 \cdot 22 + 6 \\ 22 &= 3 \cdot 6 + 4 \\ 6 &= 1 \cdot 4 + 2 \\ 4 &= 2 \cdot 2 \end{aligned}$$

Odatle je $(172, 50) = 2$.

Primjetimo da iz prve jednakosti Euklidova algoritma možemo zapisati $r_1 = b - q_1 a$. Uvrštavanjem u idući redak dobivamo $r_2 = (1 + q_1 q_2)a - q_2 b$. Nastavljajući na isti način, uvrštavanjem u naredne jednakosti, možemo zaključiti da postoje cijeli brojevi x i y za koje vrijedi

$$ax + by = r_n = (a, b).$$

Prethodni identitet se obično naziva *Bezoutov identitet*.

U Primjeru 5 bi na taj način dobili redom:

$$\begin{aligned} 22 &= 172 - 3 \cdot 50 \\ 6 &= 7 \cdot 50 - 2 \cdot 172 \\ 4 &= 7 \cdot 172 - 24 \cdot 50 \\ (172, 50) = 2 &= 31 \cdot 50 - 9 \cdot 172 \end{aligned}$$

Ovim je dan i postupak za nalaženje cjelobrojnih rješenja jednadžbe $ax + by = (a, b)$. Rješivost sličnih jednadžbi je prokomentirana u idućem teoremu:

Teorem 1.2.1. *Neka su a i b cijeli brojevi. Najmanji prirodan broj m za kojeg postoji cjelobrojno rješenje jednadžbe $ax + by = m$ je (a, b) . Štoviše, jednadžba $ax + by = m$ ima cjelobrojno rješenje ako i samo ako (a, b) dijeli m .*

Dokaz. Kako $(a, b) \mid a$ i $(a, b) \mid b$, mora vrijediti i $(a, b) \mid ax + by$. Prema tome, ako jednadžba $ax + by = m$ ima cjelobrojno rješenje, tada $(a, b) \mid m$. Ukoliko je m prirodan broj manji od (a, b) , tada m nije djeljiv s (a, b) pa promatrana jednadžba nema rješenja za takav broj m .

U razmatranjima prije teorema smo pokazali kako postoji cjelobrojno rješenje jednadžbe $ax + by = (a, b)$. Neka je $m \in \mathbb{N}$ takav da $(a, b) \mid m$. Tada postoji $d \in \mathbb{N}$ za koji vrijedi $m = (a, b) \cdot d$. Direktno slijedi

$$adx + bdy = d \cdot (a, b) = m$$

pa je dx, dy traženo cjelobrojno rješenje. \square

Prethodni teorem pokazuje kako su brojevi a i b relativno prosti ako i samo ako jednadžba $ax + by = 1$ ima cjelobrojno rješenje.

Kod svakog algoritma je prirodno zapitati se koliko je brz, tj. koliko je koraka potrebno da bi se izvršio. Tako postoje situacije u kojima je Euklidov algoritam izrazito efikasan, kao npr. $a = 51$, $b = 105$:

$$\begin{aligned} 105 &= 2 \cdot 51 + 3 \\ 51 &= 17 \cdot 3, \end{aligned}$$

no i one u prilikom čijeg je izvršavanja potrebno znatno više koraka, kao npr. $a = 89$, $b = 144$:

$$\begin{aligned} 144 &= 1 \cdot 89 + 55 \\ 89 &= 1 \cdot 55 + 34 \\ 55 &= 1 \cdot 34 + 21 \\ 34 &= 1 \cdot 21 + 13 \\ 21 &= 1 \cdot 13 + 8 \\ \\ 13 &= 1 \cdot 8 + 5 \\ 8 &= 1 \cdot 5 + 3 \\ 5 &= 1 \cdot 3 + 2 \\ 3 &= 1 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 2 \cdot 1. \end{aligned}$$

Slijedeći rezultat daje ogradu na broj mogućih koraka Euklidova algoritma.

Propozicija 1.2.2. *Neka su a i b prirodni brojevi, pri čemu je $b \geq a$. Za broj koraka Euklidova algoritma vrijedi da je manji ili jednak od $5 \cdot (\lfloor \log a \rfloor + 1)$.*

Dokaz. Podsjetimo kako je broj znamenki broja a jednak upravo $\lfloor \log a \rfloor + 1$.

Pretpostavimo kako smo primjenom Euklidova algoritma dobili sljedeći niz jednakosti

$$\begin{aligned} b &= q_{n-1}a + r_{n-1} \\ a &= q_{n-2}r_{n-1} + r_{n-2} \\ &\vdots \\ r_3 &= q_1r_2 + r_1 \\ r_2 &= q_0r_1, \end{aligned}$$

dakle imamo n koraka u provedbi algoritma te smo, samo za potrebe ovog dokaza, označili dobivane ostatke redom s $a = r_n > r_{n-1} > \dots > r_1$.

Kako je $q_i \geq 1$ za sve i , dobivamo $r_{i+1} \geq r_i + r_{i-1}$. Osim toga, $r_1 \geq 1$ i $r_2 \geq 2$. Iz toga dobivamo

$$\begin{aligned} r_3 &\geq r_2 + r_1 \geq 3 \\ r_4 &\geq r_3 + r_2 \geq 5 \\ r_5 &\geq r_4 + r_3 \geq 8. \end{aligned}$$

Možemo zaključiti kako je $r_i \geq F_i$, gdje je F_i i -ti Fibonaccijev broj (primjetimo kako se Fibonaccijevi brojevi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 pojavljuju i u prethodnom primjeru). Dakle, $a \geq F_n$ i broj znamenki od a je veći ili jednak broju znamenki od F_n .

Kako bi ocijenili broj znamenki Fibonaccijeva broja, koristimo Binetovu formulu $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}((\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{n+1} - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n+1})$. Za velike n je izraz $(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{n+1}$ mali (blizu nuli) te možemo koristiti ocjenu $F_n \approx \frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{n+1}$. Iz ove ocjene slijedi

$$\log F_n \approx (n+1) \log(\frac{1+\sqrt{5}}{2}) - \log \sqrt{5} \approx \frac{n}{5},$$

jer je $\log(\frac{1+\sqrt{5}}{2}) \approx \frac{1}{5}$. Prema tome, broj znamenki broja a nije veći od broja koraka algoritma podijeljenog s 5, tj. broj koraka algoritma je manji ili jednak od broja znamenki broja a uvećanog 5 puta, odnosno $\lfloor \log a \rfloor + 1 \geq \frac{n}{5}$. \square

Napomenimo kako se još neke činjenice o mogućnostima korištenja Euklidova algoritma, koja svjedoče njegovoj efikasnosti i zapanjujućoj jednostavnosti, mogu vidjeti u [9].

1.3 Verižni razlomci

Neka je α realan broj. Najprije stavimo $a_0 = \lfloor \alpha \rfloor$ te definiramo $b_0 = \alpha - a_0$. Ukoliko je $b_0 \neq 0$, stavimo $\alpha_1 = \frac{1}{b_0}$. Primjetimo da je $\alpha_1 > 0$ te $\alpha = a_0 + \frac{1}{\alpha_1}$.

Nastavimo isti postupak s α_1 : neka je redom $a_1 = \lfloor \alpha_1 \rfloor$, $b_1 = \alpha_1 - a_1$. Ako je $b_1 \neq 0$, definiramo $\alpha_2 = \frac{1}{b_1}$ te nastavljamo na isti način. Ovaj postupak staje ukoliko je $b_n = 0$ za neki n , u suprotnom se može nastaviti u nedogled.

Pogledajmo ovaj postupak na primjeru $\alpha = \frac{172}{50}$. Redom je $a_0 = 3$, $b_0 = \frac{22}{50}$, zatim $\alpha_1 = \frac{50}{22}$, $a_1 = 2$, $b_1 = \frac{6}{22}$. Nadalje, $\alpha_2 = \frac{22}{6}$, $a_2 = 3$, $b_2 = \frac{4}{6}$ te $\alpha_3 = \frac{6}{4}$, $a_3 = 1$, $b_3 = \frac{2}{4}$. Naposlijetku, $\alpha_4 = \frac{4}{2} = a_4 = 2$ i $b_4 = 0$.

Ovim smo dobili idući zapis racionalnog broja $\frac{172}{50}$:

$$\frac{172}{50} = 3 + \frac{22}{50} = 3 + \frac{1}{\frac{50}{22}} = 3 + \frac{1}{2 + \frac{6}{22}} = 3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{22}{6}}} = \dots = 3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}},$$

koji se naziva *razvoj racionalnog broja $\frac{172}{50}$ u jednostavni verižni razlomak*, dok se izrazi koje smo redom dobivali $(3, 3 + \frac{1}{2}, 3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}, \dots)$ nazivaju *parcijalne konvergentne*. Kraće gornji razvoj u verižni razlomak označavamo s $[3, 2, 3, 1, 2]$, jer je tim nizom potpuno određen.

Primjetimo kako se upravo ovaj niz brojeva pojavio u Primjeru 5. Općenito, neka

je $\alpha = \frac{a}{b}$ i neka su primjenom Euklidova algoritma na par (a, b) dobivene jednakosti

$$\begin{aligned} a &= q_1 b + r_1 \\ b &= q_2 r_1 + r_2 \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3 \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n. \end{aligned}$$

Tada je $a_0 = \lfloor \alpha \rfloor = q_1$, $b_0 = \frac{r_1}{b}$, $\alpha_1 = \frac{b}{r_1}$. Potom $a_1 = \lfloor \alpha_1 \rfloor = q_2$, $b_1 = \frac{r_2}{r_1}$, $\alpha_2 = \frac{r_1}{r_2}$ itd. Odatle dobivamo

$$\frac{a}{b} = q_1 + \cfrac{1}{q_2 + \cfrac{1}{q_3 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{q_n}}}}$$

te $\frac{a}{b} = [q_1, q_2, \dots, q_n]$. Primijetimo da je $\alpha_i > 1$ za sve i pa je $q_i \geq 1$ za $i \geq 2$. Osim toga, $q_1 \leq 0$ ako je $\frac{a}{b} \leq 0$.

Još je Euler u 18. stoljeću uočio kako se Euklidov algoritam može uklopi u postupak razvoja racionalnog broja u jednostavni verižni razlomak te je u narednih stotinjak godina upravo to postao omiljeni način opisa Euklidova algoritma. Čak je i Gauss u svom djelu *Disquisitiones* ignorirao sam Euklidov postupak te se referirao isključivo na postupak razvoja racionalnog broja u verižni razlomak. Povratak Euklidova algoritma u osnovnu upotrebu se dogodio oko 1860. godine, za što je ponajprije zaslužan Dirichlet, koji je ovaj algoritam koristio na otprilike sličan način kako ćemo mi to učiniti u ovom poglavljju.

Opisani postupak razvoja broja α u verižni razlomak staje jedino ukoliko je α racionalan broj. Iracionalni brojevi odgovaraju beskonačnim verižnim razlomcima, što ćemo opisati idućim primjerom.

Primjer 6. Odredite razvoj u jednostavni verižni razlomak broja $\sqrt{2}$.

Sada je $\alpha = \sqrt{2}$, $a_0 = 1$ i $b_0 = \sqrt{2} - 1$ te $\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2} + 1$.

U idućem koraku dobivamo $a_1 = 2$, $b_1 = \sqrt{2} - 1$, jednako kao i u prethodnom. Naravno, $\alpha_2 = \sqrt{2} + 1$ te $a_2 = a_1$. Prema tome, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \sqrt{2} + 1$ te $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = 2$. Sada $\sqrt{2}$ možemo zapisati u obliku

$$\sqrt{2} = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \ddots}}},$$

ili kraće $\sqrt{2} = [1, \bar{2}]$, gdje $\bar{2}$ označava uzastopno ponavljanje broja 2. Gornji razvoj iracionalnog broja $\sqrt{2}$ u verižni razlomak treba promatrati kao aproksimaciju iracionalnog broja parcijalnim konvegentama $[1, 2], [1, 2, 2], [1, 2, 2, 2], \dots$, koje zaista predstavljaju konvergentan niz racionalnih brojeva čiji limes je jednak $\sqrt{2}$.

Napomenimo kako sam Euklidov algoritam ne igra značajnu ulogu pri razvoju iracionalnih brojeva u verižne razlomke.

1.4 Prosti brojevi

Prirodan broj n , $n > 1$, nazivamo prostim ukoliko nema niti jednog djelitelja d za koji vrijedi $1 < d < n$. Broj koji nije prost se naziva složen. Primijetimo kako su jedini pozitivni djelitelji prostog broja p brojevi 1 i p .

Na primjer, broj 11 je prost, dok je broj $187 = 11 \cdot 17$ složen.

Važnost prostih brojeva se očituje u činjenici da se svaki prirodan broj veći od jedan može prikazati u obliku produkta potencija prostih brojeva, što ćemo u ovom poglavlju i dokazati.

Najprije navedimo jednu važnu tvrdnju, poznatu pod nazivom aksiom dobre uređenosti: *Svaki neprazan podskup skupa prirodnih brojeva ima najmanji element*.

Označimo skup svih prirodnih brojeva koji se ne mogu prikazati u obliku produkta prostih brojeva sa S te neka je a najmanji element tog skupa. Očito, a nije prost broj, jer bi inače na trivijalan način bio prikazan u obliku produkta prostih brojeva. Prema tome, postoje prirodni brojevi b i c , oba veći od 1, takvi da je $a = b \cdot c$. Kako su b i c oba manji od a , ne mogu biti elementi skupa S te se oba mogu napisati kao produkt prostih brojeva. No, tada se i a može napisati u obliku produkta prostih brojeva, što nije moguće. Dakle, skup S je prazan.

Na primjer, $28 = 7 \cdot 4 = 7 \cdot 2 \cdot 2 = 7 \cdot 2^2$.

Jedinstvenost ovakvog rastava ćemo prokomentirati u sljedećem podnaslovu.

1.4.1 Osnovni teorem aritmetike

Pokažimo najprije korisnu lemu:

Lema 1.4.1. *Neka je p prost broj te neka su a i b cijeli brojevi takvi da $p \mid a \cdot b$. Tada $p \mid a$ ili $p \mid b$.*

Dokaz. Neka p ne dijeli jednog od brojeva a , b . Možemo pretpostaviti da $p \nmid a$. Trebamo dokazati da tada p dijeli b . Kako p ne dijeli cijeli broj a , a jedini djelitelji prostog broja p su 1 i p , slijedi da je $(a, p) = 1$. Prema Teoremu 1.2.1, postoje cijeli brojevi x, y takvi da je $ax + py = 1$. Množenjem s b dobivamo $abx + pby = b$. Kako p dijeli ab , slijedi da p dijeli b , što je i trebalo dokazati. \square

Prethodna lema se može direktno generalizirati na produkt proizvoljno mnogo faktora:

Lema 1.4.2. *Neka je p prost broj te neka su a_1, a_2, \dots, a_n cijeli brojevi takvi da $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$. Tada $p \mid a_i$ za neki $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.*

Sada smo spremni dokazati *Osnovni teorem aritmetike*:

Teorem 1.4.3. *Prikaz svakog prirodnog broja većeg od 1 u obliku produkta potencija prostih brojeva je jedinstven do na poredak faktora.*

Dokaz. Neka je n prirodan broj veći od 1 te neka su $n = p_1 p_2 \cdots p_k$ i $n = q_1 q_2 \cdots q_l$ dva prikaza broja n u obliku produkta prostih brojeva. Tada je $p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_l$

pa $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_l$. Prema Lemi 1.4.2, $p_1 \mid q_i$ za neki i . Kako su p_1 i q_i oba prosti, slijedi $p_1 = q_i$. Permutiranjem faktora q_1, \dots, q_l , možemo uzeti da je $i = 1$ te nakon kraćenja dobivamo $p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_l$.

Sličnim zaključivanjem dobivamo $p_2 = q_2, p_3 = q_3, \dots, p_k = q_k$ te $k = l$. Time je teorem u potpunosti dokazan. \square

Ovim smo pokazali da svaki prirodan broj $n \geq 2$ možemo (na način jedinstven do na poredak) prikazati u obliku

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

gdje je $k \in \mathbb{N}$, $p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{N}$ različiti prosti brojevi te, naravno, $\alpha_i \in \mathbb{N}$. Npr., $96 = 2^5 \cdot 3$.

Prema tome, proste brojeve možemo smatrati temeljnim gradivnim bolokovima pomoću kojih se može, na način jedinstven do na poredak, prikazati svaki prirodan broj.

Iduća propozicija, koju navodimo bez dokaza, daje koristan kriterij djeljivosti:

Propozicija 1.4.4. *Neka su $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ i $b = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \cdots q_l^{\beta_l}$ prirodni brojevi dani rastavom na proste faktore. Broj a je djeljiv brojem b ako i samo ako za svaki q_j , $j \in \{1, 2, \dots, l\}$ postoji neki $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ tako da je $q_j = p_i$ i $\alpha_i \geq \beta_j$.*

Primjer 7. $18 = 2 \cdot 3^2 \mid 54 = 2 \cdot 3^3$, no $36 = 2^2 \cdot 3^2 \nmid 54$.

1.4.2 Skup prostih brojeva

S \mathcal{P} označavamo skup svih prostih brojeva. Idući rezultat opisuje osnovno svojstvo ovog skupa:

Teorem 1.4.5. *Skup \mathcal{P} je beskonačan.*

Dokaz. Dokazat ćemo ovaj teorem na dva načina. Prvi dokaz potječe još od Euklida.

Pretpostavimo kako je skup prostih brojeva konačan, te stavimo $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$. Promotrimo broj $q = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. Očito je $q > p_i$ za sve $i = 1, 2, \dots, k$ pa $q \notin \mathcal{P}$. Prema tome, broj q nije prost pa mora biti djeljiv nekim prostim brojem. Ako $p_i \mid q$, tada $p_i \mid q - p_1 p_2 \cdots p_k$ te $p_i \mid 1$, što nije moguće. Dakle, skup prostih brojeva je beskonačan.

Drugi dokaz koristi metode matematičke analize.

Riemannova zeta funkcija je definirana s

$$\zeta(s) = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots,$$

gdje je s kompleksan broj. Primjetimo da je $\zeta(1)$ upravo harmonijski red, koji je divergentan.

Pretpostavimo ponovno kako je skup prostih brojeva konačan, te neka su, jednostavnosti radi, 2, 3, 5 i 7 svi prosti brojevi. Tada se svaki prirodan broj n može prikazati

u obliku $n = 2^{\alpha_1}3^{\alpha_2}5^{\alpha_3}7^{\alpha_4}$. Koristeći ovaj rastav, harmonijski red $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ možemo zapisati u obliku konačnog produkta

$$(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots)(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots)(1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \dots)(1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \dots).$$

Svaki od faktora je jednak sumi geometrijskog reda, odakle slijedi da je suma harmonijskog reda jednaka $\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{7}{6} = \frac{35}{8}$, što je u suprotnosti s divergencijom harmonijskog reda.

Odatle slijedi kako prostih brojeva ima beskonačno mnogo. \square

Također svaki prirodan broj n možemo zapisati u obliku $n = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p}$, gdje je $\alpha_p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ te su svi osim konačno mnogo brojeva α_p jednakci nuli.

Ukoliko su s $a = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\alpha_p}$, $b = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\beta_p}$ dani prikazi prirodnih brojeva a i b u obliku produkata potencija prostih brojeva, tada se lako može vidjeti da vrijedi $(a, b) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(\alpha_p, \beta_p)}$. Možemo zaključiti kako se najveći zajednički djelitelj može lako odrediti ukoliko je poznat rastav danih brojeva na proste faktore, tj. ukoliko je poznata njihova faktorizacija. No, postupak faktorizacije prirodnog broja na proste faktore i ispitivanje prostosti danog broja pripadaju među najteže probleme u teoriji brojeva, za čije rješavanje postoje brojni algoritamski postupci.

Za prirodan broj n kažemo da je *potpun kvadrat* ako postoji cijeli broj m takav da je $n = m^2$. Brojevi 1, 4, 16, 49 su potpuni kvadrati, dok npr. niti jedan prost broj nije potpun kvadrat.

Može se lako vidjeti da je prirodan broj $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, $n \geq 2$, potpun kvadrat ako i samo ako $2 \mid \alpha_i$ za sve $i = 1, 2, \dots, k$ (zaista, zapišemo li $\alpha_i = 2 \cdot \beta_i$, tada je $n = (p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k})^2$, dok je obrat očigledan).

Za prirodan broj n kažemo da je *kvadratno slobodan* ako je 1 najveći potpuni kvadrat koji ga dijeli, tj. ukoliko iz $m^2 \mid n$, $m \in \mathbb{N}$, slijedi $m = 1$. Na primjer, brojevi 6 i 15 su kvadratno slobodni, dok 12 i 100 nisu. Također, svaki prost broj je kvadratno slobodan. Prirodan broj $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, $n \geq 2$, je kvadratno slobodan ako i samo ako je $\alpha_i = 1$ za svaki i .

1.4.3 Broj djelitelja i suma djelitelja prirodnog broja

U ovom potpoglavlju će nas interesirati samo pozitivni djelitelji prirodnih brojeva. Dakle, neka je n prirodan broj veći od 1, te zapišimo n u obliku $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ (ukoliko je $n = 1$, broj i suma djelitelja su očiti).

Sa $\sigma(n)$ označavamo sumu svih pozitivnih djelitelja broja n , dok s $\tau(n)$ označavamo broj svih pozitivnih djelitelja od n .

Prema Propoziciji 1.4.4, svaki djelitelj broja n je oblika $p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}$, gdje je $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$, za sve $i = 1, 2, \dots, k$. Osim toga, vidimo da svakim ovakvim odabirom eksponenata $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ dobivamo po jedan djelitelj broja n . Prema tome, kako svaki β_i možemo odabrati na $\alpha_i + 1$ načina, po principu produkta slijedi

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).$$

Primjer 8. Neka je $n = 100$. Kako je $100 = 2^2 \cdot 5^2$, dobivamo $\tau(100) = (2+1)(2+1) = 9$.

Neka su sada a i b relativno prosti prirodni brojevi, prikažimo ih u obliku $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ i $b = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \cdots q_l^{\beta_l}$. Kako je $(a, b) = 1$, mora vrijediti $p_i \neq q_j$, za sve i, j . Dakle, $a \cdot b = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} \cdot q_1^{\beta_1} \cdots q_l^{\beta_l}$ odakle slijedi

$$\tau(ab) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1) \cdot (\beta_1 + 1) \cdots (\beta_l + 1) = \tau(a)\tau(b).$$

Funkciju $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ za koju vrijedi $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$ za relativno proste a i b te $f(1) = 1$, nazivamo *multiplikativna funkcija*.

Pokazali smo da je funkcija τ multiplikativna.

Pokažimo da i funkcija σ ima to svojstvo. Očito je $\sigma(1) = 1$. Osim toga, $\sigma(p^k) = 1 + p + p^2 + \cdots + p^k = \frac{p^{k+1}-1}{p-1}$, za prost broj p .

Promotrimo najprije $\sigma(n)$ u slučaju $n = p^k q^l$, gdje su p i q različiti prosti brojevi. Tada redom imamo:

$$\begin{aligned} \sigma(p^k q^l) &= 1 + p + p^2 + \cdots + p^k + q + pq + p^2 q + \cdots + p^k q + \cdots + \\ &\quad q^l + pq^l + p^2 q^l + \cdots + p^k q^l \\ &= (1 + p + p^2 + \cdots + p^k)(1 + q + q^2 + \cdots + q^l) \\ &= \frac{p^{k+1}-1}{p-1} \cdot \frac{q^{l+1}-1}{q-1} \\ &= \sigma(p^k)\sigma(q^l). \end{aligned}$$

Generalizacijom prethodnog računa dobivamo da je i funkcija σ multiplikativna te

$$\sigma(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1}-1}{p_i-1} = \sigma(p_1^{\alpha_1})\sigma(p_2^{\alpha_2}) \cdots \sigma(p_k^{\alpha_k}).$$

Primjer 9. $\sigma(100) = \sigma(2^2 \cdot 5^2) = \frac{2^3-1}{2-1} \cdot \frac{5^3-1}{5-1} = 217$.

1.4.4 Fermatovi i Mersennovi brojevi

U ovom kratkom potpoglavlju uvodimo neke specijalne brojeve, koji su od posebnog interesa u teoriji brojeva.

Pierre de Fermat je bio francuski pravnik te matematičar iz hobija, koji je dao veliki doprinos u analitičkoj geometriji i teoriji vjerojatnosti, a smatra se i jednim od začetnika diferencijalnog računa. Posebno se ipak ističe svojim rezultatima u teoriji brojeva.

Fermatovi brojevi su brojevi oblika $F_n = 2^{2^n} + 1$, gdje je n nenegativan cijeli broj. Prvih nekoliko Fermatovih brojeva su:

$$3, 5, 17, 257, 65537, 4294967297, 18446744073709551617, \dots$$

Među Fermatovim brojevima ima i prostih i složenih, a zanimljivo je da su jedini poznati prosti Fermatovi brojevi upravo F_0, F_1, F_2, F_3 i F_4 . Sam Pierre de Fermat

(kojeg ćemo spominjati i u još nekoliko navrata) je smatrao da je i F_5 prost, no 100-tinjak godina nakon Fermata je Leonard Euler pronašao rastav $4294967297 = 641 \cdot 6700417$. Drugi složeni Fermatovi brojevi također imaju posebno velike proste djelitelje te ih je iz tog razloga vrlo teško faktorizirati.

Još jedna posebnost Fermatovih brojeva leži u tome što zadovoljavaju nekoliko rekurzivnih relacija, koje se mogu dokazati induktivno:

$$\begin{aligned} F_n &= (F_{n-1} - 1)^2 + 1 \\ F_n &= F_{n-1} + 2^{2n-1} F_0 F_1 \cdots F_{n-2} \\ F_n &= F_{n-1}^2 - 2(F_{n-2} - 1)^2 \\ F_n &= F_0 F_1 \cdots F_{n-1} + 2 \end{aligned}$$

Posljednju od navedenih relacija ćemo iskoristiti u dokazu idućeg rezultata:

Propozicija 1.4.6. *Neka su i, j nenegativni cijeli brojevi. Ako je $i \neq j$, tada je $(F_i, F_j) = 1$.*

Dokaz. Bez smanjenja općenitosti možemo pretpostaviti $i > j$. Prema navedenoj relaciji, vrijedi $F_i = F_0 \cdots F_j \cdots F_{i-1} + 2$. Kako $(F_i, F_j) \mid F_i$ i $(F_i, F_j) \mid F_0 \cdots F_j \cdots F_{i-1}$, slijedi da $(F_i, F_j) \mid 2$. No, svi Fermatovi brojevi su neparni, odakle dobivamo $(F_i, F_j) = 1$. \square

Prije nego se dotaknemo Mersennovih, definirajmo *savršene* brojeve:

Za prirodan broj n kažemo da je savršen ako vrijedi $\sigma(n) = 2n$, tj. ako je jednak sumi svojih djelitelja manjih od njega.

Primjeri savršenih brojeva su 6 i 28, jer je $6 = 1 + 2 + 3$ te $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$.

Sam naziv savršeni brojevi duguju Pitagorejcima, koji su brojevima često pridavalii mistična svojstva. Također, mnogo stoljeća su se filozofi bavili mističnim i religijskim značajem savršenih brojeva. Tako je Sveti Augustin objasnio da je Bog mogao stvoriti svijet odjednom, ali je izabrao to učiniti u šest dana jer je savršenstvo stvaranja svijeta simbolizirano savršenim brojem 6. Rani komentatori Starog zavjeta objašnjavali su da je savršenstvo svemira reprezentirano brojem 28, brojem dana koji je potreban da Mjesec obide Zemlju.

Problem određivanja parnih savršenih brojeva datira gotovo od matematičkih početaka i još je Euklid oko 300. godine prije Krista pokazao da je broj $2^n - 1$ prost povlači da je broj $2^{n-1}(2^n - 1)$ savršen. Stari Grci su poznavali samo četiri savršena broja: 6, 28, 496, 8128, koji su navedeni u Nikomahovoj knjizi *Introductio Arithmeticae*. Na osnovi toga je nastala slutnja da n -ti savršen broj ima točno n znamenki te da parni savršeni brojevi završavaju naizmjence na znamenke 6 i 8.

No obje navedene pretpostavke su se pokazale netočnima kada je Cataldi pokazao da su peti, šesti i sedmi savršeni broj jednaki 33550336, 8589869056 i 137438691328. Napomenimo i kako parni savršeni brojevi zaista završavaju znamenkama 6 i 8, ali ne naizmjenično.

Oko 2000 godina poslije Euklida, Euler je dopunio njegov rezultat:

Teorem 1.4.7. *Paran broj n je savršen ako i samo ako se može prikazati u obliku $n = 2^{k-1}(2^k - 1)$, gdje je broj $2^k - 1$ prost.*

Dokaz. Neka je $n = 2^{k-1}(2^k - 1)$, gdje je $2^k - 1$ prost. Direktno slijedi $\sigma(2^{k-1}) = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^{k-1} = \frac{2^{k-1+1}-1}{2-1} = 2^k - 1$ te $\sigma(2^k - 1) = 1 + 2^k - 1 = 2^k$. Kako su 2^{k-1} i $2^k - 1$ relativno prosti, mulfikativnost funkcije σ povlači $\sigma(n) = \sigma(2^{k-1}) \cdot \sigma(2^k - 1) = (2^k - 1) \cdot 2^k = 2n$ pa je broj n savršen.

Obratno, neka je n savršen; zapišimo ga u obliku $n = 2^k \cdot m$, gdje je $k \geq 0$ i m neparan. Kako je $\sigma(n) = 2n$, dobivamo

$$2^{k+1} \cdot m = 2n = \sigma(n) = \sigma(2^k \cdot m) = \sigma(2^k) \cdot \sigma(m) = (2^{k+1} - 1)\sigma(m).$$

Iz prethodnih jednakosti zaključujemo da $2^{k+1} - 1$ dijeli $2^{k+1} \cdot m$. Kako su 2^{k+1} i $2^{k+1} - 1$ relativno prosti, $2^{k+1} - 1$ dijeli m . Zapišimo sada m u obliku $m = (2^{k+1} - 1)m'$. Dobivamo da je $\sigma(m) = 2^{k+1}m'$ te $n = (2^{k+1} - 1)2^k m'$.

Preostaje još dokazati da je $m' = 1$ i da je $2^{k+1} - 1$ prost broj.

Ako je $m' \neq 1$, slijedi $\sigma(m) \geq 1 + m' + m$. No, vidjeli smo da je $\sigma(m) = 2^{k+1}m' = (2^{k+1} - 1)m' + m' = m + m' < 1 + m' + m$. Prema tome, $m' = 1$ te $m = 2^{k+1} - 1$. S druge strane, $\sigma(m) = m + m' = m + 1$ pa je m (tj. $2^{k+1} - 1$) prost broj. \square

Napomenimo kako još nije poznato postoji li neki neparan savršen broj.

Prema prethodnom teoremu, važnu ulogu pri određivanju parnih savršenih brojeva imaju prosti brojevi oblika $2^k - 1$. Upravo takvi brojevi su sadržani među Mersennovim brojevima, koji su brojevi oblika $M_n = 2^n - 1$, gdje je n prirodan broj. Ovi brojevi su nazvani prema francuskom redovniku i matematičaru Marinu Mersenneu, koji je živio u drugoj polovici 16. i prvoj polovici 17. stoljeća. Napomenimo kako su Mersenne i Fermat često putem pisama raspravljali o matematičkim problemima, prvenstveno o pitanjima prostosti brojeva oblika $2^n + 1$ i $2^n - 1$.

Prvih nekoliko Mersenneovih brojeva su 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, iz čega je vidljivo da su neki Mersenneovi brojevi prosti, a neki složeni. Mersenneovi brojevi koji su prosti nazivaju se *Mersenneovi prosti brojevi*.

Propozicija 1.4.8. *Ako je Mersennov broj M_n prost, tada je i n prost broj.*

Dokaz. Ako je broj n složen, možemo ga zapisati u obliku $n = rs$, za neke prirodne brojeve r, s koji su oba veći od 1. Tada je

$$2^{rs} - 1 = (2^s - 1)(2^{s(r-1)} + 2^{s(r-2)} + \dots + x^s + 1)$$

te je M_n složen broj jer je djeljiv s $2^s - 1$. \square

U uvodu svoje knjige *Cogitata physico mathematica* 1644. godine, Mersenne je iznio posebno intersantnu tvrdnju o Mersenneovim prostim brojevima. Ustvrdio je da je M_p prost broj za $p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257$ te da je M_p složen za sve ostale proste brojeve $p < 257$. Mersenneova tvrdnja pobudila je veliko zanimanje iz razloga što su navedeni brojevi toliko veliki da nekoliko stotina godina nitko nije mogao potvrditi ni opovrgnuti njegovu tvrdnju. Tadašnjim matematičarima je bilo

jasno da Mersenne nije mogao provjeriti tvrdnju za sve navedene brojeve, ali isto tako nisu mogli ni oni. Euler je 1772. dokazao da je M_{31} prost, a Lucas 1876. da je i M_{127} prost. Američki matematičar Cole je 1903. pokazao

$$2^{67} - 1 = 193707721 \cdot 761838257287$$

odakle slijedi da M_{67} nije prost broj. Do 1947. su testirani svi Mersennovi brojevi M_n za $n \leq 257$ te je pokazano da je Mersenne napravio pet pogrešaka: neispravno je zaključio da su M_{67} i M_{257} prosti te da su M_{61} , M_{89} i M_{107} složeni.

Još nije dokazana slučnja da postoji beskonačno mnogo prostih Mersennovih brojeva.

Iskažimo na ovom mjestu i kriterij za ispitivanje prostosti Mersennovih brojeva koji se naziva Lucas-Lehmerov test.

Teorem 1.4.9. *Definirajmo niz prirodnih brojeva (s_n) sa $s_1 = 4$, $s_{n+1} = s_n^2 - 2$. Neka je p neparan prost broj. Mersennov broj M_p je prost ako i samo ako M_p dijeli s_{p-1} .*

Dokaz navedenog kriterija, koji daleko nadilazi okvire ovog udžbenika, se može naći u [10], Poglavlje 4.

Poglavlje 2

KONGRUENCIJE

Teorija kongruencija predstavlja još jedno naslijede 'Princa matematike', Carl Friedricha Gaussa, koji je ovu moćnu tehniku, poznatu i pod nazivom modularna aritmetika zasnovao u svom djelu *Disquisitiones Arithmeticae*, objavljenom 1801. Spomenuta knjiga se sastojala od sedam poglavlja, od kojih je prvih šest bilo posvećeno teoriji brojeva.

Svakodnevni primjer ove teorije srećemo pri mjerenu vremena, gdje koristimo takozvanu aritmetiku modulo 12 dijeleći dan na dva perioda u trajanju od 12 sati.

2.1 Definicija i osnovna svojstva

Neka je n prirodan broj, te neka su a i b cijeli brojevi. Ako n dijeli razliku $a - b$, tada kažemo da je a kongruentan b modulo n , ili da su a i b kongruentni modulo n , te pišemo $a \equiv b \pmod{n}$.

Primjetimo da je a djeljivo s n ako i samo ako je $a \equiv 0 \pmod{n}$. Također, ako je c prirodan broj i $a \equiv b \pmod{n}$, tada je i $ac \equiv bc \pmod{nc}$.

Primjer 10. $17 \equiv 5 \pmod{12}$ i $5 \equiv 5 \pmod{12}$. Slično, $24 \equiv 0 \pmod{12}$. Također, $6 \equiv -34 \pmod{40}$.

Napomena 2.1.1. Budući da $n \mid a - b$ ako i samo ako $-n \mid a - b$, gdje je $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, dovoljno je promatrati samo pozitivne brojeve n .

Lema 2.1.2. Neka je n prirodan broj. Biti kongruentan modulo n je relacija ekvivalencije na skupu cijelih brojeva.

Dokaz. Kako $n \mid 0 = a - a$, očito je $a \equiv a \pmod{n}$. Također, kako $n \mid a - b$ ako i samo ako $n \mid b - a$, vrijedi i $a \equiv b \pmod{n}$ ako i samo ako je $b \equiv a \pmod{n}$.

Neka su sada a, b, c cijeli brojevi te neka vrijedi $a \equiv b \pmod{n}$ i $b \equiv c \pmod{n}$. Iz $n \mid a - b$ i $n \mid b - c$ dobivamo $n \mid a - b + b - c = a - c$ te $a \equiv c \pmod{n}$. \square

U idućoj propoziciji navodimo osnovna svojstva kongruencija:

Propozicija 2.1.3. (1) Neka su a, a', b, b' cijeli brojevi te n prirodan broj. Neka je $a \equiv a' \pmod{n}$ i $b \equiv b' \pmod{n}$. Tada vrijedi i $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$, $a - b \equiv a' - b' \pmod{n}$.

(mod n) te $a \cdot b \equiv a' \cdot b'$ (mod n).

(2) Neka su a, b, c cijeli brojevi i n prirodan broj. Neka su brojevi a i n relativno prosti. Ako je $ab \equiv ac$ (mod n), tada vrijedi $b \equiv c$ (mod n).

Dokaz. (1) Dokažimo treću tvrdnju, prve dvije se mogu dokazati na isti način. Prema uvjetima propozicije, postoje cijeli brojevi m i m' takvi da je $a - a' = mn$ i $b - b' = m'n$. Odatle je $ab - a'b' = ab - ab' + ab' - a'b' = a(b - b') + (a - a')b' = am'n + b'm'n$. Prema tome, n dijeli $ab - a'b'$ pa je $ab \equiv a'b'$ (mod n).

(2) Kako su a i n relativno prosti, prema Teoremu 1.2.1 postoje cijeli brojevi x i y takvi da je $ax + ny = 1$. Iz kongruencije $ab \equiv ac$ (mod n) slijedi da postoji cijeli broj k takav da je $a(b - c) = nk$. Množenjem prethodne jednakosti s x , iz $ax = 1 - ny$ dobivamo $(b - c) - ny(b - c) = nkx$. Očito n dijeli $b - c$ pa je $b \equiv c$ (mod n). \square

Primjetimo kako tvrdnja (2) prethodne propozicije ne vrijedi općenito, tj. ukoliko a i n nisu relativno prosti. Npr. $60 \equiv 20$ (mod 5), no kongruencija $6 \equiv 2$ (mod 5) nije točna. Više informacija o kraćenju u kongruencijama donosi iduća propozicija:

Propozicija 2.1.4. Neka je $ax \equiv ay$ (mod n). Tada vrijedi $x \equiv y$ (mod $\frac{n}{d}$), gdje je $d = (a, n)$.

Dokaz. Kako je $ax \equiv ay$ (mod n), postoji cijeli broj k takav da vrijedi $ax - ay = kn$. Odatle je $\frac{a}{d}(x - y) = \frac{nk}{d}$ pa $\frac{n}{d} \mid \frac{a}{d}(x - y)$. No, kako su $\frac{n}{d}$ i $\frac{a}{d}$ relativno prosti, jer nemaju zajedničkih prostih faktora, dobivamo $\frac{n}{d} \mid x - y$ čime je tvrdnja dokazana. \square

Lako se može vidjeti, korištenjem dijela (1) Propozicije 2.1.3, kako vrijedi i obrat prethodne tvrdnje.

Primjer 11. Odredimo $x \in \mathbb{Z}$ za koji vrijedi $341x \equiv 1$ (mod 17). Kako je 340 djeljivo sa 17, slijedi $340 \equiv 0$ (mod 17) te $340x \equiv 0$ (mod 17). Prikažemo li $341x$ u obliku $340x + x$, iz prethodne propozicije nalazimo $341x \equiv x$ (mod 17). Dakle, danu kongruenciju zadovoljava svaki cijeli broj x koji je kongruentan 1 modulo 17, tj. $x \in \{\dots, -33, -16, 1, 18, 35, \dots\}$.

Pogledajmo neke jednostavne primjene kongruencija:

Propozicija 2.1.5. (1) Prirodan broj je djeljiv s 3 ako i samo ako je suma njegovih znamenki djeljiva s 3.

(2) Prirodan broj je djeljiv s 11 ako i samo ako je alternirajuća suma njegovih znamenki djeljiva s 11.

Dokaz. (1) Zapišimo prirodan broj n u obliku $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1}$, tj. neka je $n = a_1 + 10 \cdot a_2 + \dots + 10^{k-2} a_{k-1} + 10^{k-1} a_k$, gdje su a_1, \dots, a_k cijeli brojevi, $1 \leq a_k \leq 9$ i $0 \leq a_j \leq 9$ za $j < k$.

Kako je $10 \equiv 1$ (mod 3), primjenom Propozicije 2.1.3 slijedi $10^j \equiv 1$ (mod 3), za $j \geq 0$. Odatle je $n = a_1 + 10 \cdot a_2 + \dots + 10^{k-2} a_{k-1} + 10^{k-1} a_k \equiv a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1} + a_k$ (mod 3), odakle dobivamo tvrdnju propozicije.

(2) Slično kao u dokazu prve tvrdnje, iz $10 \equiv -1$ (mod 11) dobivamo $10^j \equiv (-1)^j$ (mod 11), za $j \geq 0$. Sada je $n \equiv a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{k+1} a_k$ (mod 11), čime je propozicija dokazana. \square

Jedna od najstandarnijih primjena kongruencija se nalazi u označavanju knjiga - svaka knjiga je jednoznačno određena tzv. ISBN brojem (*International Standard Book Number*). ISBN broj je niz od 10 znamenki a_1, a_2, \dots, a_{10} , npr. $0 - 387 - 95587 - 9$. Znamenke a_1, \dots, a_{10} su podijeljene u 4 skupine, od kojih prva označava gdje je knjiga izdana, druga izdavača, a treća naslov i redni broj izdanja. Posljednja znamenka, a_{10} , se naziva kontrolna znamenka te se određuje iz prethodnih:

$$a_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i \cdot a_i \pmod{11}.$$

U slučaju da je $a_{10} \equiv 10 \pmod{11}$, na posljednje mjesto se upisuje X . Kontrolna znamenka je uvedena kako bi se na efikasan način mogle korigirati učestale pogreške koje nastaju pri prepisivanju ISBN brojeva - pogreške nastale zamjenom mesta dvaju znamenki ili greškom u prepisivanju jedne znamenke.

Dakle, pretpostavimo kako je niz b_1, b_2, \dots, b_{10} dobiven prepisivanjem ISBN broja a_1, a_2, \dots, a_{10} , pri čemu je točno jedna znamenka a_j pogrešno prepisana (dakle, $a_j \neq b_j$ te $a_i = b_i$, za $i \neq j$). Pokažimo kako tada niz b_1, b_2, \dots, b_{10} ne predstavlja valjan ISBN broj.

Primijetimo kako je kongruencija $a_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i \cdot a_i \pmod{11}$ ekvivalentna s $\sum_{i=1}^{10} i \cdot a_i \equiv 0 \pmod{11}$. Odatle je $\sum_{i=1}^{10} i \cdot b_i \equiv \sum_{i=1}^{10} i \cdot b_i - \sum_{i=1}^9 i \cdot a_i \pmod{11}$. No, time dobivamo kongruenciju $\sum_{i=1}^{10} i \cdot b_i \equiv j(b_j - a_j) \pmod{11}$. Kako je $b_j \neq a_j$, s desne strane prethodne kongruencije ne možemo dobiti nula, pa niz b_1, b_2, \dots, b_{10} ne predstavlja ISBN broj.

Slično se može provjeriti i situacija u kojoj je niz b_1, b_2, \dots, b_{10} dobiven zamjenom mesta dvaju znamenki valjanog ISBN broja.

2.1.1 Potpuni i reducirani sustavi ostataka

Neka je n prirodan broj veći od 1. Skup $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ se naziva *potpuni sustav ostataka modulo n* ako za svaki cijeli broj b postoji jedinstveni $a_i \in S$ za koji vrijedi $b \equiv a_i \pmod{n}$.

Napomena 2.1.6. Primijetimo kako svaki potpuni sustav ostataka modulo n ima točno n elemenata. Također, svaki n-člani skup koji se sastoji od cijelih brojeva međusobno nekongruentnih modulo n predstavlja jedan potpuni sustav ostataka modulo n.

Najčešće korišten potpun sustav ostataka modulo n je skup $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Navedimo i nekoliko potpunih sustava ostataka modulo 5:

$$\{0, 1, 2, 3, 4\}, \{-2, -1, 0, 1, 2\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{-10, -8, -4, 13, 39\}.$$

Očito ih postoji beskonačno mnogo, što pokazuje i iduća lema:

Lema 2.1.7. Neka je $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ potpuni sustav ostataka modulo n. Tada je i $\{b \cdot a_1, b \cdot a_2, \dots, b \cdot a_n\}$ potpuni sustav ostataka modulo n, za svaki cijeli broj b za koji vrijedi $(b, n) = 1$.

Dokaz. Prema Napomeni 2.1.6, dovoljno je dokazati da su svaka dva elementa skupa $\{b \cdot a_1, b \cdot a_2, \dots, b \cdot a_n\}$ međusobno nekongruentna modulo n . Prepostavimo da je $b \cdot a_i \equiv b \cdot a_j \pmod{n}$, za neke i, j . Kako su b i n relativno prosti, Propozicija 2.1.3 (2) povlači $a_i \equiv a_j \pmod{n}$. Iz činjenice da je S potpuni sustav ostataka modulo n , zaključujemo da je $i = j$, čime je tvrdnja dokazana. \square

U nastavku ćemo kratko komentirati rješavanje linearnih kongruencija, tj. kongruencija oblika $ax \equiv b \pmod{n}$. Prvotni interes za rješavanje ovakvih kongruencija dolazi iz diofantskih jednadžbi, gdje se često mogu iskoristiti za pronalaženje rješenja.

Lema 2.1.8. *Neka su a i n prirodni brojevi. Ako su a i n relativno prosti, tada kongruencija $ax \equiv b \pmod{n}$ ima jedinstveno rješenje modulo n , tj. ako je $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ potpuni sustav ostataka modulo n tada postoji jedinstveni $a_i \in S$ takav da je $x \equiv a_i \pmod{n}$ rješenje polazne kongruencije.*

Dokaz. Kako su a i n relativno prosti, postoji cijeli brojevi k, l za koje vrijedi $ak + nl = 1$, odakle je $akb + nkb = b$. Očito, $akb \equiv b \pmod{n}$ pa je $x = kb$ rješenje polazne kongruencije.

Neka su sada x_1 i x_2 dva rješenja polazne kongruencije. Dokažimo da su ova rješenja međusobno kongruentna modulo n .

Kako je $ax_1 \equiv b \pmod{n}$ i $ax_2 \equiv b \pmod{n}$, dobivamo $ax_1 \equiv ax_2 \pmod{n}$. Primjenom Propozicije 2.1.3 slijedi $x_1 \equiv x_2 \pmod{n}$ što je i trebalo dokazati. \square

Primjer 12. Kongruencija $3x \equiv 50 \pmod{113}$ ima jedinstveno rješenje, koje je dano s $x \equiv 92 \pmod{113}$.

Jednadžba $5x + 15y = 1$ nema cjelobrojnih rješenja, jer kongruencija $5x \equiv 1 \pmod{15}$ nema rješenja.

Teorem 2.1.9. *Neka su a i n prirodni brojevi. Kongruencija $ax \equiv b \pmod{n}$ ima rješenja ako i samo ako $d = (a, n)$ dijeli b . Ako je x_0 rješenje kongruencije $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$, tada su sva međusobno nekongruentna rješenja modulo n polazne kongruencije dana s $x_0, x_0 + \frac{n}{d}, x_0 + \frac{2n}{d}, \dots, x_0 + \frac{(d-1)n}{d}$.*

Dokaz. Ako kongruencija $ax \equiv b \pmod{n}$ ima rješenja, tada postoji cijeli broj k takav da je $ax = b + nk$ pa očito $d = (a, n)$ dijeli b .

Kako su brojevi $\frac{a}{d}$ i $\frac{n}{d}$ relativno prosti, prema prethodnoj lemi postoji rješenje kongruencije $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$. Označimo to rješenje s x_0 . Dakle, postoji cijeli broj k takav da je $\frac{a}{d}x_0 - \frac{b}{d} = k \cdot \frac{n}{d}$, tj. $ax_0 - b = kn$. Prema tome, x_0 je i rješenje kongruencije $ax \equiv b \pmod{n}$.

Stavimo $y = x_0 + t\frac{n}{d}$. Tada je $ay = ax_0 + t\frac{an}{d}$. Kako d dijeli a , $\frac{a}{d}$ je prirodan broj pa n dijeli $ay - ax_0$. Odатле dobivamo $ay \equiv ax_0 \pmod{n}$ te $ay \equiv b \pmod{n}$. Dakle, y je također rješenje polazne kongruencije.

Prepostavimo sada da je y rješenje polazne kongruencije. Tada je $ay \equiv ax_0 \pmod{n}$, odakle proizlazi da $\frac{n}{d}$ dijeli $\frac{a}{d}(y - x_0)$. Pošto su $\frac{a}{d}$ i $\frac{n}{d}$ relativno prosti, $\frac{n}{d}$ dijeli $y - x_0$ pa je $y = x_0 + k\frac{n}{d}$, za neki cijeli broj k .

Neka je $0 \leq j \leq d - 1$ takav da je $k \equiv j \pmod{d}$. Tada je $y \equiv x_0 + j\frac{n}{d} \pmod{n}$.

Lako se vidi da nikoja dva različita broja oblika $x_0 + j \frac{n}{d}$ nisu međusobno kongruentni modulo n za $0 \leq j \leq d - 1$. \square

U situaciji kao u iskazu prethodnog teorema, kažemo da kongruencija ima d rješenja modulo n . Općenito, kažemo da kongruencija modulo n ima m rješenja ukoliko ima m međusobno nekongruentnih rješenja modulo n .

Neka je n prirodan broj veći od 1. Skup $S = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ se naziva *reducirani sustav ostataka modulo n* ako za svaki cijeli broj b , koji je relativno prost s n , postoji jedinstveni $a_i \in S$ za koji vrijedi $b \equiv a_i \pmod{n}$.

Primjer 13. Skupovi $\{1, 2, 3, 4\}$ i $\{-2, -6, 6, 7\}$ su reducirani sustavi ostataka modulo 5, dok je npr. $\{1, 5\}$ reducirani sustav ostataka modulo 6.

Primjetimo da postoji beskonačno mnogo reduciranih sustava ostataka modulo n . Također, svaki reducirani sustav ostataka modulo n ima jednako mnogo elemenata.

2.2 Eulerova funkcija

Neka je n prirodan broj. Broj prirodnih brojeva u nizu $1, 2, \dots, n$ koji su relativno prosti s n se označava s $\varphi(n)$; ovim je definirana funkcija $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ koja se naziva *Eulerova funkcija*.

Primjetimo kako je $\varphi(n)$ upravo broj elemenata reduciranog sustava ostataka modulo n , te u dalnjem reducirani sustav ostataka možemo zapisati u obliku $\{a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(n)}\}$.

Primjer 14. $\varphi(5) = 4$, $\varphi(6) = 2$, $\varphi(1) = 1$. Ako je p prost broj, tada je $\varphi(p) = p - 1$. Također, ako za neki prirodan broj n vrijedi $\varphi(n) = n - 1$, možemo zaključiti kako je n relativno prost sa svakim manjim prirodnim brojem. Prema tome, n nema djelitelja većeg od 1 i manjeg od n pa je prost.

Na isti način kao Lema 2.1.7 se može dokazati i

Lema 2.2.1. Neka je $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(n)}\}$ potpuni sustav ostataka modulo n . Tada je $i \{b \cdot a_1, b \cdot a_2, \dots, b \cdot a_{\varphi(n)}\}$ potpuni sustav ostataka modulo n , za svaki cijeli broj b za koji vrijedi $(b, n) = 1$.

Teorem 2.2.2 (Eulerov teorem). Neka je a cijeli broj te n prirodan broj. Ako su brojevi a i n relativno prosti, tada je $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Dokaz. Neka je $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(n)}\}$ reducirani sustav ostataka modulo n . Prema prethodnoj lemi je tada i skup $\{a \cdot a_1, a \cdot a_2, \dots, a \cdot a_{\varphi(n)}\}$ reducirani sustav ostataka modulo n . Prema tome, za svaki a_i , $1 \leq i \leq \varphi(n)$ postoji jedinstveni $a_j \in S$ takav da je $a_i \equiv a \cdot a_j \pmod{n}$.

Primjenom Propozicije 2.1.3 (1) dobivamo $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{\varphi(n)} \equiv aa_1 \cdot aa_2 \cdots aa_{\varphi(n)} \pmod{n}$, tj. $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{\varphi(n)} \equiv a^{\varphi(n)} a_1 \cdot a_2 \cdots a_{\varphi(n)} \pmod{n}$.

Kako je $(a_i, n) = 1$ za sve $a_i \in S$, uzastopnom primjenom Propozicije 2.1.3 (2) dobivamo $1 \equiv a^{\varphi(n)} \pmod{n}$, čime je teorem dokazan. \square

Ako je p prost broj i a cijeli broj koji nije djeljiv s p , tada su a i p relativno prosti. Idući rezultat je direktna posljedica Eulerova teorema:

Korolar 2.2.3 (Mali Fermatov teorem). *Neka je p prost broj i a cijeli broj. Tada je $a^p \equiv a \pmod{p}$ te ako p ne dijeli a vrijedi $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.*

U ostatku ovog potpoglavlja ćemo opisati još neka svojstva Eulerove funkcije.

Lema 2.2.4. *Neka je p prost broj i $k \in \mathbb{N}$. Tada je $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.*

Dokaz. Neka je $1 \leq n \leq p^k$. Ako p ne dijeli n , tada su n i p^k relativno prosti. Prema tome, jedini brojevi u nizu $1, 2, \dots, p^k$ koji nisu relativno prosti s p^k su $p, 2p, 3p, \dots, p^k = p^{k-1} \cdot p$, tj. njih p^{k-1} . Odatle slijedi $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$. \square

Pokazat ćemo i da je Eulerova funkcija množilična. Očito je $\varphi(1) = 1$. U tome će nam koristiti i idući rezultat:

Lema 2.2.5 (Kineski teorem o ostacima). *Neka su m i n relativno prosti prirodni brojevi. Tada za svaki par cijelih brojeva a, b postoji jedinstveno (modulo mn) rješenje sustava kongruencija $x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n}$.*

Dokaz. Primijetimo kako se ovdje radi o sustavu dvije jednadžbe, tj. kongruencije, s jednom nepoznanicom. Promatramo preslikavanje

$$i : \{0, 1, \dots, mn - 1\} \rightarrow \{0, 1, \dots, m - 1\} \times \{0, 1, \dots, n - 1\},$$

dano s $i(t) = (t \pmod{m}, t \pmod{n})$.

Primjera radi, neka je $m = 2, n = 5$ te $a = 1, b = 3$. U tom slučaju je npr. $i(0) = (0, 0), i(1) = (1, 1), i(2) = (0, 2), i(7) = (1, 2), i(8) = (1, 3), i(9) = (1, 4)$. Očito, rješenje polaznog sustava kongruencija je x za koji vrijedi $i(x) = (1, 3)$ te je dano s $x \equiv 8 \pmod{10}$.

Prema tome, da bi dokazali tvrdnju leme dovoljno je dokazati da je preslikavanje i bijekcija. Kako skupovi $\{0, 1, \dots, mn - 1\}$ i $\{0, 1, \dots, m - 1\} \times \{0, 1, \dots, n - 1\}$ imaju jednakom mnogo elemenata, dovoljno je pokazati da je i injekcija.

Neka su $t_1, t_2 \in \{0, 1, \dots, mn - 1\}$ takvi da je $i(t_1) = i(t_2)$. Tada je $t_1 \equiv t_2 \pmod{m}$ i $t_1 \equiv t_2 \pmod{n}$, tj. $m | t_1 - t_2$ i $n | t_1 - t_2$. Kako su m i n relativno prosti, slijedi $mn | t_1 - t_2$ te (zbog $-mn + 1 \leq t_1 - t_2 \leq mn - 1$) $t_1 = t_2$. Prema tome, i je injekcija. \square

Punu verziju Kineskog teorema o ostacima iskazujemo, bez dokaza, u sljedećem teoremu:

Teorem 2.2.6. *Neka su n_1, n_2, \dots, n_k u parovima relativno prosti prirodni brojevi te neka su a_1, a_2, \dots, a_k cijeli brojevi. Tada postoji rješenje sustava kongruencija $x \equiv a_1 \pmod{n_1}, x \equiv a_2 \pmod{n_2}, \dots, x \equiv a_k \pmod{n_k}$. Ako je x_0 jedno rješenje, tada su sva rješenja dana s $x \equiv x_0 \pmod{n_1 n_2 \cdots n_k}$.*

Prema predaji, Kinezi su se često u primjenama koristili upravo prethodnim rezultatom. Neki navodi govore kako je postupak određivanja rješenja sustava kongruencija prvenstveno korišten u vojne svrhe prilikom prebrojavanja preživjelih vojnika nakon bitke. Naime, umjesto da se nepotrebno troši vrijeme na dugačka prebrojavanja, preživjeli vojnici bi se jednostavno postrojili u redove od po 3, 4, 5, 7, 11 i eventualno 13 vojnika (ukoliko bi se radilo o većem broju preživjelih vojnika), a potom bi se pomoću broja vojnika preostalih u zadnjem redu dobivao sustav kongruencija. Rješavanje tako dobivenog sustava bi rezultiralo kongruencijom iz koje bi se direktno dobio točan broj preživjelih vojnika. Naravno, broj vojnika u pojedinom redu se mogao i mijenjati, jedino se uvijek moralo paziti da brojevi budu međusobno relativno prosti te njihov produkt dovoljno velik kako bi se iz završne kongruencije mogao očitati točan broj preživjelih vojnika. Sam dokaz prethodnog teorema te njegove primjene i poopćenja se mogu naći u [2].

Teorem 2.2.7. *Eulerova funkcija je multiplikativna.*

Dokaz. Već smo vidjeli da je $\varphi(1) = 1$. Neka su sada m, n relativno prosti cijeli brojevi. Definiramo skupove $S_1 = \{a \in \mathbb{N} : a \leq mn, (a, mn) = 1\}$, $S_2 = \{a \in \mathbb{N} : a \leq m, (a, m) = 1\}$, $S_3 = \{a \in \mathbb{N} : a \leq n, (a, n) = 1\}$. Očito je $|S_1| = \varphi(mn)$, $|S_2| = \varphi(m)$ te $|S_3| = \varphi(n)$.

Za $t \in \{0, 1, \dots, mn - 1\}$, neka je $i(t) = (a, b)$, gdje je i preslikavanje definirano u dokazu Leme 2.2.5. Primijetimo da je $(t, mn) = 1$ ako i samo ako je $(a, m) = (b, n) = 1$. Zaista, kako je $t = k_1m + a = k_2n + b$, slijedi da je svaki zajednički prost djelitelj brojeva t i m (odnosno, t i n) ujedno i zajednički prost djelitelj brojeva a i m (odnosno, b i n).

Prema tome, restrikcija preslikavanja i na skup S_1 daje bijekciju sa skupa S_1 na skup $S_2 \times S_3$, što povlači $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. \square

Neka je $n > 1$ prirodan broj. Prikažimo n u obliku $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Tada je

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}) = \varphi(p_1^{\alpha_1})\varphi(p_2^{\alpha_2}) \cdots \varphi(p_k^{\alpha_k}) \\ &= (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1})(p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1}) \cdots (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1}) \\ &= p_1^{\alpha_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) p_2^{\alpha_2} \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots p_k^{\alpha_k} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).\end{aligned}$$

Primjer 15. $\varphi(100) = 100 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40$.

2.3 Wilsonov i Lagrangeov teorem

Neka je p prost broj i $a < p$ prirodan broj. Tada postoji prirodan broj b za koji vrijedi $a \cdot b \equiv 1 \pmod{p}$ i takav broj b se naziva multiplikativni inverz od a modulo p .

Zaista, kako su a i p relativno prosti, prema Teoremu 1.2.1 postoji cijeli brojevi x, y za koje vrijedi $ax + py = 1$, odakle slijedi $ax \equiv 1 \pmod{p}$ te možemo uzeti $b = x$. Primijetimo kako iz Leme 2.1.8 slijedi da su svaka dva multiplikativna inverza od a

modulo p međusobno kongruentni modulo p , pa postoji jedinstveni multiplikativni inverz od a modulo p koji je prirodan broj manji od p .

Općenito, ako je $a \in \mathbb{N}$ te $p \nmid a$, tada postoji multiplikativni inverz od a modulo p .

Jedna od najistaknutijih primjena multiplikativnih inverza se pojavljuje prilikom evaluacije produkta $(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1)$ modulo p , gdje je p prost broj. Iduće teorem se pripisuju engleskom matematičaru iz 18. stoljeća Johnu Wilsonu, iako je vjerojatno otkriven od strane Ibn al-Hayhama u 10. stoljeću, a prvi poznati dokaz je Lagrangeov i datira iz 1770.

Teorem 2.3.1 (Wilsonov teorem). *Ako je p prost broj tada je $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.*

Dokaz. Prema diskusiji koja prethodi teoremu, za svaki od brojeva $1, 2, \dots, p-1$ postoji multiplikativni inverz modulo p . Dakle, svaki od faktora u $(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdots (p-1)$ daje 1 modulo p u produktu sa svojim multiplikativnim inverzom, osim faktora koji su sami sebi inverzni. Odredimo takve faktore.

Neka je $x \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ takav da vrijedi $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Tada $p \mid x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Kako je p prost broj i $1 \leq x \leq p-1$, slijedi da je ili $x-1=0$ ili $x+1=p$. Prema tome, jedini faktori u $(p-1)!$ koji su sami sebi inverzni su 1 i $p-1$. Odatle dobivamo $(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \pmod{p}$ te $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$. \square

Prethodni teorem ustvari daje interesantnu karakterizaciju prostih brojeva, jer vrijedi i obrat:

Propozicija 2.3.2. *Ako prirodan broj n zadovoljava kongruenciju $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$, tada je n prost.*

Dokaz. Iz $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ slijedi $(n-1)! \equiv -1 \pmod{m}$ za svaki m koji dijeli n . Ako je $m < n$, tada se m pojavljuje kao faktor od $(n-1)!$ pa je $(n-1)! \equiv 0 \pmod{m}$ te $-1 \equiv 0 \pmod{m}$. Odavde je $m=1$ te n nema pozitivnih djelitelja različitih od 1 i n pa je n prost. \square

Primjer 16. *Iz Wilsonova teorema slijedi $100! \equiv -1 \pmod{101}$, tj. $101 \mid 100! + 1$.*

Sada ćemo pokazati kako Wilsonov teorem može biti primijenjen na rješavanje određenih kongruencija, kakve ćemo detaljnije obraditi u poglavljju 4.

Korolar 2.3.3. *Neka je p neparan prost broj. Kongruencija $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ima rješenja ako i samo ako je $p \equiv 1 \pmod{4}$.*

Dokaz. Neka je p neparan prost broj te neka je $k = \frac{p-1}{2}$. Korištenjem kongruencije $p-i \equiv -i \pmod{p}$ u produktu

$$(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdots k \cdot (k+1) \cdots (p-2) \cdot (p-1)$$

za $i = 1, 2, \dots, k$, dobivamo

$$(p-1)! \equiv (-1)^k (k!)^2 \pmod{p}.$$

Wilsonov teorem daje $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ te slijedi $(-1)^k (k!)^2 \equiv -1 \pmod{p}$ odakle dobivamo i $(k!)^2 \equiv (-1)^{k+1} \pmod{p}$. Kako je k paran za $p \equiv 1 \pmod{4}$, slijedi $(k!)^2 \equiv -1 \pmod{p}$ te je $x = k!$ rješenje kongruencije $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$.

Neka je sada $p \equiv 3 \pmod{4}$, odakle je $k = \frac{p-1}{2}$ neparan. Ako je x rješenje kongruencije $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$, tada su x i p relativno prosti te je, prema Malom Fermatovom teoremu, $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Prema tome, $1 \equiv (x^2)^k \equiv (-1)^k \equiv -1 \pmod{p}$, što nije moguće jer je p neparan te u ovom slučaju polazna kongruencija nema rješenja. \square

Činjenica da kongruencija $x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ima najviše dva rješenja (nekongruentna modulo p) ima važnu generalizaciju:

Teorem 2.3.4 (Lagrangeov teorem). *Ako je p prost broj i $P(x)$ polinom stupnja n s cjelobrojnim koeficijentima, koji nisu svi djeljivi s p , tada kongruencija $P(x) \equiv 0 \pmod{p}$ ima najviše n rješenja modulo p .*

Dokaz. Dokaz provodimo indukcijom po stupnju polinoma $P(x)$. Ako je stupanj promatranog polinoma jednak 1, tvrdnja teorema slijedi direktno iz Leme 2.1.8. Pretpostavimo kako tvrdnja vrijedi za polinome stupnja manjeg od n te neka je $P(x)$ polinom stupnja n .

Najprije, ako kongruencija $P(x) \equiv 0 \pmod{p}$ nema rješenja, tada nemamo što dokazivati. Nasuprot, pretpostavimo kako je $P(x_0) \equiv 0 \pmod{p}$, za neki cijeli broj x_0 te neka je $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, gdje su $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$.

Odatle je $P(x) \equiv P(x) - P(x_0) \pmod{p}$, tj. $P(x) \equiv a_n(x^n - x_0^n) + a_{n-1}(x^{n-1} - x_0^{n-1}) + \dots + a_1(x - x_0) \pmod{p}$.

Kako za $k \in \mathbb{N}$ vrijedi $x^k - x_0^k = (x - x_0)(x^{k-1} + x^{k-2}x_0 + \dots + xx_0^{k-2} + x_0^{k-1})$, desnu stranu prethodne kongruencije možemo zapisati u obliku $(x - x_0)Q(x)$, gdje je $Q(x)$ polinom stupnja $n - 1$ s cjelobrojnim koeficijentima.

Kako je p prost broj, kongruencija $P(x) \equiv 0 \pmod{p}$ pokazuje kako je ili $x - x_0 \equiv 0 \pmod{p}$ ili $Q(x) \equiv 0 \pmod{p}$. Prema pretpostavci indukcije, kongruencija $Q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ ima najviše $n - 1$ rješenja pa kongruencija $P(x) \equiv 0 \pmod{p}$ ima najviše n rješenja (x_0 i rješenja kongruencije $Q(x) \equiv 0 \pmod{p}$), što je i trebalo dokazati. \square

2.4 Pseudoprosti i Carmichaelovi brojevi

Jedno od najčešće postavljenih pitanja u teoriji brojeva, je kako na efikasan način provjeriti je li neki broj prost. Postupci koji za rezultat imaju potvrđan ili negativan odgovor na takvo pitanje se nazivaju *testovi prostosti*. Posebna važnost ispitivanja prostosti se danas može naći u modernoj kriptografiji, gdje su šifre bazirane na teškoći ispitivanja prostosti i faktorizacije prirodnih brojeva na proste faktore. Više će o tome biti riječi u potpoglavljima 3.2 i 3.3.

Wilsonov teorem, dokazan u prethodnom potpoglavlju, daje vrlo jednostavnu karakterizaciju prostih brojeva. Nažalost, komplikiranost računanja faktorijskih faktora ga čini vrlo neefikasnim testom prostosti, čak i za male prirodne brojeve poput dvoznamenastih.

S druge strane, Mali Fermatov teorem prezentira jedan način za ispitivanje prostosti - prema ovom teoremu, tj. prema njegovu obratu, ako postoji prirodan broj $a < n - 1$ takav da $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ tada n nije prost broj. Ovaj test je mnogo jednostavnije primjeniti, jer se u modularnoj aritmetici velike potencije mogu izračunati mnogo lakše od faktorijela. No, ukoliko za prirodan broj n vrijedi $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ za sve $a \in \{2, 3, \dots, n - 1\}$, ne znači da je n prost, jer Malim Fermatovim teoremom nije dana karakterizacija prostih brojeva.

Još je u antičkoj Kini smatrano da je prirodan broj n prost ako i samo ako je $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ (primijetimo da je, na primjer, $2^{6-1} = 32 \equiv 2 \pmod{6}$ te 6 nije prost broj), a ova tvrdnja je opovrgнута tek 1819. idućim primjerom:

Primjer 17. *Odredimo čemu je 2^{340} kongruentno modulo 341.*

Na ovom primjeru ćemo kratko pokazati i način određivanja potencija modulo prirodnog broja. Najprije primijetimo da je $2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{341}$. Sada dobivamo

$$2^{340} = (2^{10})^{34} \equiv 1^{34} \equiv 1 \pmod{341}.$$

Prema tome, 341 je prošao prethodni test, ali nije prost jer vrijedi $341 = 11 \cdot 31$. Dakle, 341 je složen broj koji posjeduje određena svojstva prostih brojeva. Iz tog razloga kažemo da je 341 pseudoprost u bazi 2.

Prirodni brojevi koji su pseudoprosti u bazi 2 su rijetki, no ima ih mnogo.

Teorem 2.4.1. *Postoji beskonačno mnogo prirodnih brojeva koji su pseudoprosti u bazi 2.*

Dokaz. Neka je n pseudoprost broj u bazi 2. Dokazat ćemo da je tada i $2^n - 1$ pseudoprost u bazi 2. Na taj način, polazeći od 341 dobivamo beskonačno mnogo prirodnih brojeva koji su pseudoprosti u bazi 2.

Kako je n pseudoprost u bazi 2, n je složen neparan broj. Direktno slijedi da je i $2^n - 1$ složen. Kako je $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, dobivamo $2^n \equiv 2 \pmod{n}$ te se 2^n može prikazati u obliku $nk + 2$ za neki prirodan broj k . Iz jednakosti

$$2^{nk} - 1 = (2^n)^k - 1 = (2^n - 1)((2^n)^{k-1} + (2^n)^{k-2} + \dots + 1)$$

slijedi

$$2^{nk} = 2^{2^n - 2} \equiv 1 \pmod{2^n - 1}$$

što je i trebalo pokazati. \square

Definicija 2.4.2. *Ako je n neparan složen broj te a cijeli broj za koji vrijedi $(n, a) = 1$ i $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, kažemo da je n pseudoprost u bazi a .*

Slično kao u dokazu Teorema 2.4.1, može se pokazati da postoji beskonačno mnogo pseudoprostih brojeva u bazi a za svaki prirodan broj $a \geq 2$. Pogledajmo jedan zanimljiv primjer vezan uz pseudoprostost.

Primjer 18. Ranije smo vidjeli da je 341 pseudoprost u bazi 2. Iz činjenice da je 341 prošao test s bazom 2 nismo mogli zaključiti niti da je prost niti da je složen. Provedimo isti test s bazom 3. Dakle, treba odrediti čemu je 3^{340} kongruentno modulo 3. Iskoristiti ćemo činjenicu da je $341 = 11 \cdot 31$.

Kako je $3^5 = 243 \equiv 1 \pmod{11}$, slijedi $3^{340} = (3^5)^{68} \equiv 1 \pmod{11}$.

Prema Malom Fermatovu teoremu, vrijedi $3^{30} \equiv 1 \pmod{31}$ pa je $3^{340} = 3^{11 \cdot 30 + 10} \equiv 3^{10} \pmod{31}$. Kako je $3^4 = 81 \equiv 19 \pmod{31}$, dobivamo $3^{10} = 3^4 \cdot 3^4 \cdot 3^2 \equiv -1 \pmod{31}$.

Sada se može lako vidjeti da je $3^{340} \not\equiv 1 \pmod{340}$ pa 341 nije pseudoprost u bazi 3.

Primijetimo da dobivena kongruencija pokazuje da 341 nije prost.

Prirodno se nameće iduće pitanje: ako je prirodan broj n pseudoprost u bazi a za svaki $2 \leq a \leq n$, $(n, a) = 1$, da li je tada n prost? Ili, obratno, ako je prirodan broj n složen, da li nužno postoji a takav da je $(n, a) = 1$ i $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$? Nažalost, odgovor na ovo pitanje je negativan, što pokazuje da se navedenim testom ne mogu s potpuno sigurnošću određivati prosti brojevi (iako se na taj način mogu određivati s velikom vjerojatnošću).

Definicija 2.4.3. Složen prirodan broj n se naziva Carmichaelov broj ako za sve prirodne brojeve a koji su relativno prosti s n vrijedi $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

Primijetimo da je složen broj n Carmichaelov ako i samo ako je pseudoprost u svakoj bazi koja je relativno prosta s n .

Primjer 19. Najmanji Carmichaelov broj je 561. Lako se vidi da je $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$. Neka je a prirodan broj koji je relativno prost s 561. Tada očito a nije djeljiv niti s 3, niti s 11 niti s 17 pa je $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$ za $m \in \{3, 11, 17\}$. Kako je $560 = 2 \cdot 280 = 10 \cdot 56 = 16 \cdot 35$ dobivamo da je $a^{560} \equiv 1 \pmod{m}$ za $m \in \{3, 11, 17\}$ odakle slijedi $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$

Carmichaelovi brojevi se pojavljuju mnogo rjeđe od prostih brojeva i prilično je teško konstruirati ih. Samu egzistenciju takvih brojeva je utvrdio R.D. Carmichael 1912. te pretpostavio da takvih brojeva postoji beskonačno mnogo, što je dokazano tek 1992.

Lema 2.4.4. Svaki Carmichaelov broj je neparan.

Dokaz. Zaista, ako je n paran broj veći od 2, tada je $(n-1)^{n-1} \equiv (-1)^{n-1} \equiv -1 \pmod{n}$ pa n nije pseudoprost u bazi $n-1$ (dva uzastopna prirodna broja su uvijek relativno prosti). \square

No, postoji i vrlo eksplicitna karakterizacija Carmichaelovih brojeva:

Teorem 2.4.5 (Korseltov kriterij). Prirodan broj n je Carmichaelov ako i samo ako je n kvadratno slobodan te za svaki prost broj p koji dijeli n vrijedi i da $p-1$ dijeli $n-1$.

Dokaz. Pokažimo samo dovoljnost. Dokaz drugog smjera zainteresirani čitatelj može naći u [7], poglavljje 6.

Neka je $n = p_1 p_2 \cdots p_k$, gdje su p_1, p_2, \dots, p_k međusobno različiti prosti brojevi te $p_i - 1 \mid n - 1$ za sve $i = 1, 2, \dots, k$. Neka je a prirodan broj koji je relativno prost s n . Tada je a relativno prost i s p_i te slijedi $a^{p_i-1} \equiv 1 \pmod{p_i}$, za $i = 1, 2, \dots, k$. Kako $p_i - 1$ dijeli $n - 1$, možemo pisati $n - 1 = m(p_i - 1)$ odakle je $a^{n-1} = (a^{p_i-1})^m \equiv 1 \pmod{p_i}$. Prema tome, $a^{n-1} - 1$ je višekratnik svakog p_i pa je i višekratnik od n (primijetimo kako smo ovdje iskoristili činjenicu da je n kvadratno slobodan) te je $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, tj. n je Carmichaelov broj. \square

Primjer 20. 1729 i 2821 su Carmichaelovi brojevi jer je $1729 = 7 \cdot 13 \cdot 19$, $2821 = 7 \cdot 13 \cdot 31$ te je 1728 djeljiv s $6, 12$ i 18 , dok je 2820 djeljiv s $6, 12$ i 30 .

Poglavlje 3

PRIMJENA KONGRUENCIJA

Temeljna primjena kongruencija, koja je vjerojatno i inicirala nastanak ove snažne metode, se nalazi u rješavanju diofantskih jednadžbi. Jedan od pristupa pri dokazivanju nerješivosti takvih jednadžbi se bazira na promatranju lijeve i desne strane modulo odabranim prirodnim brojem te pokazivanju nekongruentnosti, slično kako smo vidjeli u Primjeru 12. Na taj se način može spretno suziti manevarske prostore te promatrati samo ostatke pri dijeljenju s određenim brojem, umjesto traganja za rješenjem na čitavom skupu cijelih brojeva.

No, teorija kongruencija nalazi i mnogo širu primjenu, nasuprot Hardyjevu mišljenju navedenom na početku prvog poglavlja. Upravo je na ovoj teoriji bazirana moderna kriptografija, dok neke ideje koje se mogu vezati uz kongruencije potječu i još iz vremena galskih ratova. Time je teorija brojeva, putem kriptografije, zauzela istaknuto mjesto u omogućavanju svakodnevne zaštite sigurnosti podataka.

3.1 Linearne diofantske jednadžbe

Neka su a_1, a_2, \dots, a_n, b cijeli brojevi. Tada se jednadžba oblika

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

naziva *linearna diofantska jednadžba*. Ovdje pretpostavljamo da je n prirodan broj te da su svi brojevi a_1, a_2, \dots, a_n različiti od nule.

Rješivost linearnih diofantskih jednadžbi (u cijelim brojevima) je karakterizirana idućim teoremom:

Teorem 3.1.1. *Linearna diofantska jednadžba $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$ ima rješenja ako i samo ako $(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid b$. U tom slučaju, svako rješenje se može zapisati pomoću $n - 1$ cjelobrojnih parametara.*

Dokaz. Neka je $d = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Ako d ne dijeli b , tada linearne diofantske jednadžbe $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$ nema rješenja, jer je za bilo koje cijele brojeve x_1, x_2, \dots, x_n lijeva strana djeljiva s d , dok desna nije.

Pretpostavimo sada da d dijeli b . Dijeljenjem polazne jednadžbe s d dobivamo ekvivalentnu jednadžbu

$$a'_1x_1 + a'_2x_2 + \cdots + a'_nx_n = b', \quad (3.1)$$

gdje je $a'_i = \frac{a_i}{d}$ te $b' = \frac{b}{d}$. Očito vrijedi $(a'_1, a'_2, \dots, a'_n) = 1$.

Dokazat ćemo da ova jednadžba ima rješenja indukcijom po broju varijabli, tj. indukcijom po n .

Ukoliko je $n = 1$, tada jednadžba ima oblik $x_1 = b'$ ili $-x_1 = b'$ te jedinstveno rješenje ne ovisi niti o kakvom parametru.

Neka je sada $n \geq 2$ te pretpostavimo da jednadžba ima rješenja u slučaju da je broj varijabli manji od n . Dokažimo da tvrdnja vrijedi i za n varijabli.

Neka je $d_1 = (a'_1, a'_2, \dots, a'_{n-1})$. Tada svako rješenje jednadžbe $a'_1x_1 + a'_2x_2 + \cdots + a'_nx_n = b'$ zadovoljava i kongruenciju $a'_1x_1 + a'_2x_2 + \cdots + a'_nx_n \equiv b' \pmod{d_1}$, koja je ekvivalentna kongruenciji $a'_nx_n \equiv b' \pmod{d_1}$.

Množenjem s $(a'_n)^{\varphi(d_1)-1}$ dobivamo $(a'_n)^{\varphi(d_1)}x_n \equiv (a'_n)^{\varphi(d_1)-1}b' \pmod{d_1}$. Kako su a'_n i d_1 relativno prosti, Eulerov teorem povlači $x_n \equiv c \pmod{d_1}$, gdje je $c = (a'_n)^{\varphi(d_1)-1}b'$.

Prema tome, $x_n = c + d_1t_1$, za neki $t_1 \in \mathbb{Z}$. Uvrštavanjem ovog izraza u jednadžbu (3.1) dobivamo jednadžbu u $n - 1$ varijabli

$$a'_1x_1 + a'_2x_2 + \cdots + a'_{n-1}x_{n-1} = b' - a'_nc - a'_nd_1t_1. \quad (3.2)$$

Pokažimo da d_1 dijeli $b' - a'_nc - a'_nd_1t_1$. U tu svrhu je dovoljno dokazati da d_1 dijeli $b' - a'_nc$, tj. da je $a'_nc \equiv b' \pmod{d_1}$. No, kako je $a'_nc = (a'_n)^{\varphi(d_1)}b'$, prethodna kongruencija vrijedi jer su d_1 i a'_n relativno prosti.

Prema tome, možemo podijeliti jednadžbu (3.2) s d_1 , čime dobivamo jednadžbu oblika

$$a''_1x_1 + a''_2x_2 + \cdots + a''_{n-1}x_{n-1} = b'', \quad (3.3)$$

pri čemu je $a''_i = \frac{a'_i}{d_1}$ te $b'' = \frac{b' - a'_nc}{d_1} - a'_nd_1t_1$.

Kako je $(a''_1, a''_2, \dots, a''_{n-1}) = 1$, po pretpostavci indukcije jednadžba (3.3) ima rješenja te svako rješenje ove jednadžbe može biti napisano pomoću $n - 2$ cjelobrojna parametra. Pridodamo li tome i $x_n = c + d_1t_1$, dobivamo rješenja polazne jednadžbe $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$ zapisana u terminima $n - 1$ cjelobrojnih parametara. \square

Poseban slučaj linearnih diofantskih jednadžbi je dan idućim korolarom.

Korolar 3.1.2. *Neka su a_1, a_2 relativno prosti cijeli brojevi. Ako je ureden par (x_0, y_0) rješenje jednadžbe $a_1x + a_2y = b$, tada su sva rješenja ove jednadžbe dana s $x = x_0 + a_2t$, $y = y_0 - a_1t$.*

Primjer 21. *Rješimo linearnu diofantsku jednadžbu*

$$3x + 4y + 7z = 8.$$

Očito mora vrijediti $3x + 4y \equiv 1 \pmod{7}$ pa je $3x + 4y = 1 + 7s$, za neki cijeli broj s . Jedno rješenje ove jednadžbe je $x = -1 + 5s$, $y = 1 - 2s$. Prema prethodnom korolaru su sva rješenja dana s $x = -1 + 5s + 4t$, $y = 1 - 2s - 3t$, $t \in \mathbb{Z}$.

Uvrštavanjem u polaznu jednadžbu dobivamo $z = 1 - s$. Dakle, sva rješenja polazne jednadžbe su dana $s(x, y, z) = (-1 + 5s + 4t, 1 - 2s - 3t, 1 - s)$, $s, t \in \mathbb{Z}$.

3.2 Kriptosustavi

Znanstvena disciplina koja se bavi analiziranjem i pronalaženjem metoda pomoću kojih je poruku moguće poslati u obliku u kojem ju neće moći pročitati nitko osim onih kojima je namijenjena se naziva *kriptografija* (od grčki krypto - skrivati te grafo - pisati). Ova disciplina je u principu prisutna od samog nastanka pisma i pisanih komunikacija, a prvi napredniji oblici se pojavljuju u antičkoj Grčkoj u petom stoljeću prije Krista.

U samoj osnovi kriptografije se nalaze dvije osobe, *pošiljaoc* i *primaoc* poruke, koje žele komunicirati sigurnim putem, tj. žele komunicirati na način da neželjene strane ne mogu odgometnuti sadržaj poruke koju pošiljaoc šalje primaocu.

Naravno, nije moguće spriječiti da poslana poruka ne dospije u ruke neželjene treće strane. Ono što se može spriječiti, barem na nekoj razini, jest da osoba neupućena u način pisanje poruke ne može razumjeti njen sadržaj.

Poruka koju pošiljaoc želi poslati se naziva *otvoreni tekst*, kojeg pošiljaoc prije slanja transformira koristeći unaprijed dogovoren postupak šifriranja - time se dobiva šifrirani tekst ili *šifrat*.

I otvoreni tekst i šifrat se sastoje od elemenata određenih, ne nužno jednakih, alfabeta (općenito, skupova simbola koji su elementi teksta poruke). Najčešće se alfabet otvorenog teksta sastoji od slova abecede i znamenki, ponekad i interpunkcijskih znakova, dok se alfabet šifrata često sastoji samo od znamenki, kako bi se dodatno otežalo određivanje teksta izvorne poruke.

Šifrirana poruka se zatim šalje primaocu; presječe li poruku netko treći, on vidi šifrat, no treba osigurati da ne može doći do sadržaja otvorenog teksta.

S druge strane, primaoc je upućen u postupak šifriranja po dobivenu poruku može *dešifrirati* i tako saznati otvoreni tekst.

Strogo formalno, šifra je uređen par dvije funkcije, od kojih prva služi za šifriranje, a druga za dešifriranje. Ove funkcije često ovise o nekom unaprijed zadanim parametru (*ključu*), poznatom pošiljaocu i primaocu poruke. Ključ je uglavnom jednak nekom odabranom slovu abecede, broju ili nekoj ključnoj riječi.

Neka je, za odabrani parametar t , šifra koja odgovara tom parametru označena s (f_t, g_t) . Ako je x neki element alfabeta otvorenog teksta (npr. proizvoljno slovo, broj ili simbol), tada je $f_t(x) = y$ neki element alfabeta šifrata (općenito, moguća je i situacija da se niz elemenata alfabetu otvorenog teksta preslika u jedan element alfabetu šifrata, no ograničimo se na gornju situaciju). Nadalje, mora vrijediti $g_t(f_t(x)) = x$, odakle slijedi da su preslikavanja f_t i g_t injekcije.

Dakle, kriptosustav se sastoji od:

- alfabetu otvorenog teksta,

- alfabeta šifrata,
- skupa parametara,
- za svaki parametar t , uređenog para funkcija (f_t, g_t) takvih da je $g_t(f_t(x)) = x$ za svaki element x alfabeta otvorenog teksta.

U dalnjem ćemo pretpostavljati da se alfabet otvorenog teksta sastoji od slova engleske abecede te da se alfabet šifrata sastoji od slova engleske abecede i znamenki $0, 1, 2, \dots, 9$.

Nasuprot samoj kriptografiji se nalazi znanstvena disciplina pod nazivom *kriptoanaliza*, čiji zadatak je pronaći način za dešifriranje šifrirane poruke.

Primjer 22. *Pomak alfabeta ili Cezarova šifra.*

Podsjetimo kako pretpostavljamo da se alfabet otvorenog teksta koji koristimo sastoji od 26 slova engleske abecede. Svakom slovu možemo pridružiti njegov odgovarajući redni broj umanjen za 1, tj. slovu A odgovara 0, slovu B odgovara 1, ..., slovu Z odgovara 25.

Ideja ove metode (za koju se pretpostavlja da je korištena još od strane Gaja Julija Cezara) jest da se jednostavno svakom slovu korištene abecede (glezano kao cijeli broj između 0 i 25) doda (modulo 26) ključni cijeli broj k .

Ukoliko je recimo $k = 5$, tada iz poruke (otvorenog teksta) *Ne zaboravite postupak* dobivamo šifrat *SJEFGTWFANYJUTYZUFP*.

Primijetimo kako smo ovdje koristili neke sitne detalje koji ipak donekle otežavaju kriptoanalizu šifrata - zapisali smo otvoreni tekst bez razmaka i interpunkcijskih znakova te koristili isključivo velika slova, čime se otežava mogućnost pogađanja otvorenog teksta.

Dakle, alfabet otvorenog teksta i alfabet šifrata su u ovom primjeru jednaki te se sastoje od slova engleske abecede, parametri su cijeli brojevi, dok su funkcije koje služe za šifriranje i dešifriranje zbrajanje i oduzimanje s fiksiranim parametrom modulo 26.

No, predstavljena Cezarova šifra je nažalost vrlo nezahvalna radi njene sigurnosti. Zaista, iako ključni broj (parametar) k može biti bilo koji cijeli broj, zapravo postoji samo 26 različitih parametara. Jer, ukoliko su k_1 i k_2 cijeli brojevi koji su međusobno kongruentni modulo 26, tada se pomaci alfabeta za k_1 i k_2 podudaraju. Zaključujemo kako su svi predstavnici parametara iskazani upravo potpunim sustavom ostataka modulo 26.

Primjer 23. *Neka je primjenom Cezarove šifre dobiven šifrat QRSKSTSOYWENE. Odredimo otvoreni tekst (pretpostavljamo da znamo da je napisan na hrvatskom jeziku) i korišteni parametar k .*

Primijetimo kako šifrat počinje s tri uzastopna slova abecede, pa s tri uzastopna slova mora počinjati i otvoreni tekst.

Pokušavajući redom s $k = 0, 1, 2, 3$ dobivamo za početni dio QRS , PQR , OPQ , NOP . Eventualno bi posljednji dio mogao predstavljati početak nekog teksta na hrvatskom jeziku, no tada bi naredno slovo u otvorenom tekstu bilo H .

Uzmememo li da je $k = 4$, dobivamo početni dio MNO te nastavljajući i otvoreni tekst $MNOGOPOKUSAJA$. Dakle, poslana poruka je glasila 'Mnogo pokušaja', a korišteni parametar k je jednak 4.

Želimo li konstruirati što sigurniji kriptosustav, treba paziti da upravo skup parametara bude što opsežniji, jer se u primjerima poput prethodnog kriptoanaliza može provesti direktnim ispitivanjem svih mogućnosti.

Primjer 24. *Jednokratni uzorak.*

Sada ćemo predstaviti daleko sigurniji način šifriranja (po tim, naravno, smatramo da je kriptoanaliza komplikiranija). Neka je $a_1a_2a_3\dots$ vrlo dug slučajan niz prirodnih brojeva, od kojih je svaki manji ili jednak 26. Pod pojmom vrlo dugi niz smatramo da broj elemenata u ovom nizu prelazi broj znakova korištenih u otvorenom tekstu.

Šifriranje se vrši na sljedeći način: i -to slovo šifrata dobivamo dodajući modulo 26 broj a_i i -tom slovu otvorenog teksta.

Ukoliko je niz $a_1a_2a_3\dots$ dan s $a_i = (i \bmod 26) + 1$, tada iz otvorenog teksta *Ne zaboravite postupak* dobivamo šifrat *OGCEGUYIESEQCCHJLHTE*.

Kada je početni dio niza $a_1a_2\dots a_n$ iskorišten, taj dio se odbacuje, a ostatak $a_{n+1}a_{n+2}\dots$ koristi za šifriranje idućeg otvorenog teksta.

Kako su svi slučajni nizovi $a_1a_2\dots$ opisanog tipa vrlo slični, slični su i dobiveni šifrati, te je šifrirane korištenjem jednokratnih uzoraka potpuno sigurno. Osim toga, u ovom slučaju raspolažemo s golemlim brojem parametara koje možemo koristiti.

No, kako korišteni ključni niz mora biti vrlo dugačak i svaki njegov dio možemo koristiti najviše jednom, opisani postupak šifriranja se u praksi pokazuje krajnje neprimjenjiv.

Osnovni cilj kriptografije je pronaći način šifriranja koji je kombinacija onih opisanih u prethodnim primjerima - uspješno iskombinirati jednostavnost korištenja Cezarove šifre sa sigurnošću šifriranja korištenjem jednokratnih uzoraka.

Opisani primjeri pripadaju među takozvane *simetrične šifre*, kod kojih su postupak šifriranja i dešifriranja esencijalno jednaki (kakvi zbrajanje i oduzimanje modulo 26 zaista jesu). Također, navedeni postupci pripadaju među kriptosustave s *tajnim ključem*, jer su parametri korišteni pri šifriranju (ključni broj k i niz $a_1a_2a_3\dots$) poznati samo pošiljaocu i primaocu poruke.

U praksi se najkorisnijim pokazuju kriptosustavi u kojima se šifriranje može lako provesti, dok je dešifriranje gotovo neizvedivo bez poznavanja nekih dodatnih podataka (dakle, šifre (f_t, g_t) su takve da se $f_t(x)$ može lako izračunati, dok je vrijednost $g_t(y)$ neupućenima gotovo nemoguće izračunati).

Takvi kriptosustavi očito nisu simetrični te pripadaju među *asimetrične šifre*.

U takvim situacijama neki od podataka (naravno, ne i oni ključni za dešifriranje) mogu biti poznati svima, a ne samo pošiljaocu i primaocu poruke. Tada govorimo o kriptosustavima s *javnim ključem*.

Osnovni primjer asimetrije možemo vidjeti u činjenici da je dane proste brojeve lako pomnožiti, bez obzira na njihov broj znamenki, no dani složen broj je često vrlo

komplicirano prikazati u obliku produkta prostih faktora (bez poznavanja npr. nekog od faktora).

Primjer 25. Brojevi 11399 i 105929 su prosti. Njihov produkt je jednak 1207484671. No, prikazati prethodni broj u obliku produkta prostih brojeva, bez poznavanja barem jednog od njih, je prilično težak zadatak.

Upravo ovaj princip ćemo iskoristiti u idućem potpoglavlju.

3.3 RSA kriptosustav

RSA kriptosustav je nastao 1977. i nazvan je prema inicijalima trojice njegovih tvoraca, matematičara Rona Rivesta, Adia Shamira i Lena Adlemana.

Osnovne sastavnice RSA kriptosustava su multiplikativni inverzi modulo neki prirodan broj, koje smo opisali prije Wilsonova teorema, te Eulerov teorem.

Alfabet otvorenog teksta se ponovno sastoji od slova engleske abecede, no čitav postupak šifriranja i dešifriranja se obavlja nad cijelim brojevima te možemo smatrati kako se od njih sastoji i polazni alfabet (štoviše, dovoljno je uzeti da je sastavljen od prirodnih brojeva). Opišimo sada postupak šifriranja.

Neka su p_1 i p_2 prosti brojevi, po mogućnosti što veći. Označimo njihov produkt s n .

Prema potpoglavlju 2.2 znamo da je $\varphi(n) = (p_1 - 1) \cdot (p_2 - 1)$.

Nadalje, korisnik odabire i takozvani enkripcijski eksponent e , koji može biti bilo koji cijeli broj koji je relativno prost s $\varphi(n)$.

Kako su e i $\varphi(n)$ relativno prosti, slijedi da postoji multiplikativni inverz d od e modulo $\varphi(n)$, tj. $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

Multiplikativni inverz d se može odrediti iz Euklidova algoritma, jer ima svojstvo da postoji neki cijeli broj c za koji je $ed + c\varphi(n) = 1$. Broj d se naziva dekripcijski eksponent.

Neka je sada x dio otvorenog teksta koji treba šifrirati, gdje uzimamo da je x strogo manji od n . Tada se odgovarajući dio šifrata dobiva pomoću $f_t(x) = x^e \pmod{n}$, gdje je t parametar $t = (n, e)$.

Ako je y dio šifrata, dekripcija se obavlja pomoću $g_t(y) = y^d \pmod{n}$, gdje je ponovo $t = (n, e)$.

Parametar (n, e) se smatra javnim i može biti svima poznat. Također se naziva i javni ključ. Faktorizacija $n = p_1 \cdot p_2$ i podatak d se smatraju tajnim, poznati su samo pošiljaocu i primaocu poruke.

Uvjerimo se najprije da su ovako definirane funkcije zaista jedna drugoj inverzne:

Teorem 3.3.1. Za $1 \leq x < n$ vrijedi $g_t(f_t(x)) = x$, gdje je $t = (n, e)$, uz uvjet $(e, \varphi(n)) = 1$.

Dokaz. Očito je $g_t(f_t(x)) = x^{ed} \pmod{n}$.

Kako je d multiplikativni inverz od e modulo $\varphi(n)$, imamo $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ odakle slijedi da postoji $a \in \mathbb{N}$ takav da je $ed = a \cdot \varphi(n) + 1$. Odатле je $x^{ed} = x \cdot (x^{\varphi(n)})^a$.

Razlikujemo nekoliko mogućnosti:

- $(n, x) = 1$: sada je $x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ pa je $x^{ed} \equiv x \pmod{n}$;
- $(n, x) = p_1$: u ovom slučaju je $x^{ed} \equiv 0 \pmod{p_1}$ i $x^{ed} \equiv x \cdot (x^{p_2-1})^{(p_1-1)a} \equiv x \pmod{p_2}$, zbog $(x, p_2) = 1$, što slijedi iz činjenica da je $x < n$ i $p_1 \mid x$. Iz dobivenog sustava kongruencija se lako vidi, slično kao u dokazu Leme 2.2.5 da je $x^{ed} \equiv x \pmod{n}$;
- $(n, x) = p_2$: na isti način kao u prethodnom slučaju zaključujemo da je $x^{ed} \equiv x \pmod{n}$.

Iz dobivene kongruencije slijedi da je $x = x^{ed} \pmod{n}$, jer je $x < n$. Dakle, funkcije su međusobno inverzne. \square

Primjer 26. *Pokažimo na primjeru kako korištenjem RSA kriptosustava možemo šifrirati poruku TB.*

Najprije prikažimo otvoreni tekst u obliku niza prirodnih brojeva uzimajući pozicije slova u abecedi. Time dobivamo 202.

Nadalje, odaberimo proste brojeve p_1 i p_2 : neka je $p_1 = 7$ i $p_2 = 11$. Sada je $n = 77$ i $\varphi(n) = 60$. Enkripcijski eksponent e mora biti relativno prost s 60 pa uzmimo da je $e = 13$. Direktno, ili primjenom Euklidova algoritma, dobivamo da je $d = 37$.

Otvoreni tekst rastavljamo na dva dijela od kojih ćemo svaki šifrirati zasebno, kako bi bili manji od 77. Između opcija 2, 2 i 20, 2, odabiremo drugu.

Prema tome, najprije je $x = 20$, te treba odrediti $20^{13} \pmod{77}$. U tu svrhu se koristimo idućim nizom kongruencija:

$$\begin{aligned} 20^1 &\equiv 20 \pmod{77} \\ 20^2 &\equiv 15 \pmod{77} \\ 20^4 &\equiv 71 \pmod{77} \\ 20^8 &\equiv 36 \pmod{77}. \end{aligned}$$

Odatle je $20^{13} \equiv 20^8 \cdot 20^4 \cdot 20 \equiv 36 \cdot 71 \cdot 20 \equiv 69 \pmod{77}$.

U idućem koraku je $x = 2$ pa imamo $2^{13} \equiv 2^8 \cdot 2^4 \cdot 2 \equiv 256 \cdot 16 \cdot 2 \equiv 30 \pmod{77}$.

Prema tome, šifrat je jednak 69 30.

Naravno, dešifranjem bi dobili polazni otvoreni tekst 20 2.

Primijetimo kako je ključan dodatni podatak, koji omogućuje dešifriranje uz poznavanje javnog ključa (n, e) upravo faktorizacija $n = p_1 \cdot p_2$ iz koje se lako može odrediti $\varphi(n)$, a zatim i dekripcijski eksponent d . Zapravo, kako je za dešifriranje dovoljno poznavati eksponent d , u postupku dešifriranja ključnu ulogu igra poznavanje parametra $\varphi(n)$.

Prilikom korištenja RSA kriptosustava su računski najkomplikiraniji koraci određivanje izraza x^e i y^d modulo n . Kako ovaj kriptosustav često koristi eksponente s više od stotinu znamenki, prethodni izrazi mogu poprimiti vrijednosti koje su krajnje ne-pogodne za računanje.

No, primijetimo kako nama u stvari nisu potrebni prirodni brojevi x^e i y^d , već samo njihovi ostatci pri dijeljenju s n . Računanje ostataka pri dijeljenju koje daju kvadrati je standardno najlakše izvediv zadatak od svih potencija pa se računski koraci obično odvijaju na način prikazan u prethodnom primjeru. Osnovni korak je prikazati eksponent u obliku sume potencija broja 2 te iskoristiti dobivene ostatke u odgovarajućoj kongruenciji.

Primjer 27. *Digitalni potpis*

RSA kriptosustav se također koristi prilikom prenošenja digitalnog potpisa kojim se dokazuje kako je korisnik uistinu onaj za koga se predstavlja. U tu svrhu, korisnik je dužan pokazati kako posjeduje podatke kojima nitko drugi ne bi trebao raspolagati, poput nekog osobnog koda, lozinke ili poput dekripciskog eksponenta d koji dolazi uz javni ključ (n, e) .

Jasno, korisnikova ideja ne leži u tome da otkrije eksponent d , čime inkriminira sigurnost poslanih šifrata, već da na neki način samo pokaže poznavanje tog podatka.

U tu svrhu, korisnik uzima neku poznatu poruku x (npr. svoje ime) te šalje x^d mod n , šifriranu poruku koju je mogao poslati samo poznavatelj eksponenta d . Kako je podatak (n, e) javni, svatko je u mogućnosti odrediti x uzimajući e -tu potenciju od x^d mod n , jer vrijedi $(x^d)^e = x^{ed} \equiv x \pmod{n}$.

Na taj način se svatko može uvjeriti da je korisnik u posjedu tajnog eksponenta d te time i u njegov identitet.

Poglavlje 4

KVADRATNI OSTATCI

U ovom poglavlju se bavimo općenitim pitanjem posjeduje li cijeli broj a kvadratni korijen modulo n te, ukoliko posjeduje, koliko je takvih te kako ih odrediti. Jedna od osnovnih primjena se nalazi u rješavanju kvadratnih kongruencija, no također se pojavljuje i pri prikazu prirodnih brojeva u obliku $x^2 + dy^2$, gdje je $d \in \mathbb{N}$. Upravo je Fermat započeo istraživanje mogućnosti prikaza prostih brojeva u obliku $x^2 + y^2$, $x^2 + 2y^2$ te $x^2 + 3y^2$ pri čemu je primijetio važnost tzv. kvadratnog zakona reciprociteta. Taj rezultat, koji se smatra najdražim Gaussovim teoremom (dokazao ga je na ukupno osam načina) je prvi dokazao Dirichlet 1837.

4.1 Legendreov simbol

Neka su a i n relativno prosti prirodni brojevi. Ako kongruencija $x^2 \equiv a \pmod{n}$ ima rješenja, tada kažemo da je a *kvadratni ostatak* modulo n . U suprotnom kažemo da je a *kvadratni neostatak* modulo n .

Primjer 28. Prirodni brojevi 1, 2 i 4 su kvadratni ostaci modulo 7, a brojevi 3, 5 i 6 su kvadratni neostaci modulo 7.

Neka je p neparan prost broj i a cijeli broj. *Legendreov simbol* $(\frac{a}{p})$ je definiran s

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & , \text{ ako je } a \text{ kvadratni ostatak modulo } p, \\ 0 & , \text{ ako } p \mid a, \\ -1 & , \text{ ako } a \text{ nije kvadratni ostatak modulo } p. \end{cases}$$

Kombinirajući prethodni primjer s definicijom Legendreova simbola, dobivamo $(\frac{1}{7}) = (\frac{2}{7}) = 1$, $(\frac{3}{7}) = (\frac{6}{7}) = -1$ te $(\frac{14}{7}) = 0$. Primijetimo da vrijedi $(\frac{a^2}{p}) = 1$ ako p ne dijeli a i $(\frac{a^2}{p}) = 0$ ako p dijeli a .

Podsjetimo se kako, u slučaju da su a i p relativno prosti brojevi i p neparan prost, vrijedi $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (prema Korolaru 2.2.3). Euler je iskoristio ovu relaciju kako bi dobio iduću formulu za određivanje Legendreova simbola:

Teorem 4.1.1 (Eulerov kriterij). *Ako je p neparan prost broj, tada vrijedi $(\frac{a}{p}) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$. Prema tome, a je kvadratni ostatak modulo p ako i samo ako je $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.*

Dokaz. Očito je $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 0 \pmod{p}$ ako i samo ako $p | a$, tj. ako i samo ako je $(\frac{a}{p}) = 0$. Dakle, u tom slučaju je tvrdnja dokazana. Nadalje možemo uzeti da su a i p relativno prosti.

Pretpostavimo da je a kvadratni ostatak modulo p . Tada je $a \equiv b^2 \pmod{p}$ za neki b te, $(\frac{a}{p}) = 1$ po definiciji Legendreova simbola. Kako su a i p relativno prosti, slijedi da su i b i p relativno prosti. Time dobivamo $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Preostaje još provjeriti formulu iz iskaza teorema u slučaju da a nije kvadratni ostatak modulo p . Primijetimo kako vrijedi $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 \equiv b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

No, kako kongruencija $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ ima točno dva rješenja, $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$ (prema Teoremu 2.3.4 znamo da su ovo jedina rješenja), dovoljno je dokazati da $a^{\frac{p-1}{2}}$ nije kongruentno 1 modulo p kada a nije kvadratni ostatak modulo p (jer će iz toga slijediti da mora biti kongruentno -1 modulo p).

Prema istom teoremu, kongruencija $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ ima najviše $\frac{p-1}{2}$ rješenja, među kojima su moraju nalaziti $1^2, 2^2, \dots, (\frac{p-1}{2})^2$, jer se prema već dokazanom među rješenjima nalaze svi kvadratni ostaci modulo p . Pokažimo da su sva ova rješenja međusobno različita, tj. nekongruentna modulo p .

Ako su x^2, y^2 takvi da je $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$, tada slijedi da ili $p | x - y$ ili $p | x + y$. Kako je $1 < x + y < p$, dobivamo $x = y$. Dakle, sva rješenja kongruencije $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ su dana navedenim nizom koji uključuje samo kvadratne ostatke modulo p .

Prema tome, ako a nije kvadratni ostatak modulo p , tj. $(\frac{a}{p}) = -1$, slijedi $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$. \square

Direktno iz prethodnog teorema možemo zaključiti da, ukoliko je $a \equiv b \pmod{p}$, vrijedi i $(\frac{a}{p}) = (\frac{b}{p})$. Također vrijedi i tzv. 'pola-pola' svojstvo:

Korolar 4.1.2. *Ako je p neparan prost broj, tada su točno polovica brojeva $1, 2, \dots, p-1$ kvadratni ostaci modulo p .*

Dokaz. U dokazu prethodnog teorema smo vidjeli kako su $1^2, 2^2, \dots, (\frac{p-1}{2})^2$ kvadratni ostaci modulo p . Pokažimo da je svaki kvadratni ostatak modulo p kongruentan modulo p nekom od brojeva iz prethodnog niza.

Ako je neki $1 \leq a \leq p-1$ kvadratni ostatak modulo p , tada postoji x takav da je $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Možemo uzeti da je $1 \leq x \leq p-1$, jer rješenja tražimo u reduciranim sustavima ostataka modulo p .

Ako je $x \leq \frac{p-1}{2}$, tada se x^2 nalazi u prethodnom nizu. Ako je $\frac{p-1}{2} < x$, tada je $x^2 \equiv (p-x)^2 \pmod{p}$, te zbog $p-x < \frac{p-1}{2}$ slijedi da je x^2 kongruentno nekom od brojeva $1^2, 2^2, \dots, (\frac{p-3}{2})^2$ modulo p .

Time smo dokazali da u nizu $1, 2, \dots, p-1$ postoji točno $\frac{p-1}{2}$ kvadratnih ostataka modulo p , koje čine oni članovi koji su kongruentni s $1^2, 2^2, \dots, (\frac{p-1}{2})^2$ modulo p . \square

Pokažimo još nekoliko svojstava Legendreovih simbola koja su vrlo korisna pri njihovu eksplizitnom određivanju.

Propozicija 4.1.3. Za svaka dva cijela broja a_1 i a_2 te neparan prost broj p vrijedi $(\frac{a_1 a_2}{p}) = (\frac{a_1}{p})(\frac{a_2}{p})$.

Dokaz. Korištenjem Eulerova kriterija dobivamo

$$(\frac{a_1}{p})(\frac{a_2}{p}) \equiv (a_1)^{\frac{p-1}{2}} (a_2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (a_1 a_2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (\frac{a_1 a_2}{p}) \pmod{p}. \quad \square$$

Osim prethodnog svojstva multiplikativnosti, prilikom računanja je često od velike pomoći znati direktno odrediti neke Legendreove simbole.

Primjer 29. Odredimo $(\frac{-8}{3})$.

Prema prethodnoj propoziciji je $(\frac{-8}{3}) = (\frac{4}{3})(\frac{2}{3})(\frac{-1}{3}) = (\frac{2}{3})(\frac{-1}{3})$. Ostatak računa možemo provesti direktno preko Eulerova kriterija, no direktniji način za određivanje Legendreovih simbola ovog oblika ćemo opisati u ostatku ovog potpoglavlja.

Propozicija 4.1.4. Za neparan prost broj p vrijedi

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = \begin{cases} 1 & , \text{ ako je } p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1 & , \text{ ako je } p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

Drugim rječima, $(\frac{-1}{p}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$.

Dokaz. Prema Eulerovu kriteriju je $(\frac{-1}{p}) \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$.

Ako je $p \equiv 1 \pmod{4}$, tada je broj $\frac{p-1}{2}$ paran pa je $(\frac{-1}{p}) = 1$.

Ako je $p \equiv 3 \pmod{4}$, tada je broj $\frac{p-1}{2}$ neparan pa je $(\frac{-1}{p}) = -1$. \square

Propozicija 4.1.5. Za neparan prost broj p vrijedi

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} 1 & , \text{ ako je } p \equiv 1 \pmod{8} \text{ ili } p \equiv 7 \pmod{8}, \\ -1 & , \text{ ako je } p \equiv 3 \pmod{8} \text{ ili } p \equiv 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

Dokaz. Opet, prema Eulerovu kriteriju je $(\frac{2}{p}) \equiv 2^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$, no s izrazom $2^{\frac{p-1}{2}}$ je mnogo teže manipulirati nego s izrazom $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$ u prethodnoj propoziciji.

Najprije ćemo dokazati iduće kongruencije:

$$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv \begin{cases} (-1)^{\frac{p-1}{4}} & \pmod{p}, \text{ ako je } p = 4n + 1, \\ (-1)^{\frac{p+1}{4}} & \pmod{p}, \text{ ako je } p = 4n + 3. \end{cases}$$

Ako je $p = 4n + 1$, tj. $p \equiv 1 \pmod{4}$, redom imamo

$$\begin{aligned} (4n)! &\equiv (1 \cdot 3 \cdots (4n-1))(2 \cdot 4 \cdots 4n) \pmod{p} \\ &\equiv (1 \cdot 3 \cdots (4n-1))(1 \cdot 2 \cdots 2n)2^{2n} \pmod{p} \\ &\equiv (1 \cdot 3 \cdots (2n-1))((2n+1)(2n+3) \cdots (4n-1))(1 \cdot 2 \cdots 2n)2^{2n} \pmod{p} \\ &\equiv ((-1)(-3) \cdots (-2n+1))(-1)^n((2n+1)(2n+3) \cdots (4n-1)) \\ &\quad (1 \cdot 2 \cdots 2n)2^{2n} \pmod{p} \\ &\equiv (4n(4n-2) \cdots (2n+2))(-1)^n((2n+1)(2n+3) \cdots (4n-1)) \\ &\quad (1 \cdot 2 \cdots 2n)2^{2n} \pmod{p} \\ &\equiv (-1)^n 2^{2n} (4n)! \pmod{p} \end{aligned}$$

Kako je $p > 4n$, slijedi $(p, (4n)!) = 1$ te iz prethodnog izraza dobivamo $1 \equiv (-1)^n 2^{2n} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{4}} 2^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$.

Odatle slijedi $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{4}} \pmod{p}$, za $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Na potpuno analogan način se dobiva i da je $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p+1}{4}} \pmod{p}$, za $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Sada zasebno razmatramo sve mogućnosti:

- $p \equiv 1 \pmod{8}$: u ovom slučaju je $p \equiv 1 \pmod{4}$ i $\frac{p-1}{4}$ je paran broj pa je $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$,
- $p \equiv 3 \pmod{8}$: sada je $p \equiv 3 \pmod{4}$ i $\frac{p+1}{4}$ je neparan pa je $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$,
- $p \equiv 5 \pmod{8}$: sada imamo $p \equiv 1 \pmod{4}$ i $\frac{p-1}{4}$ je neparan broj pa je $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$,
- $p \equiv 7 \pmod{8}$: napokon, $p \equiv 3 \pmod{4}$ i $\frac{p+1}{4}$ je paran pa je $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.

Iz promatranih slučajeva direktno slijedi tvrdnja propozicije. \square

Prethodnu propoziciju smo mogli iskazati i u ekvivalentnom obliku $(\frac{2}{p}) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$.

Kako raspolažemo rezultatima iz prethodne dvije propozicije, uvrštavanjem dobivamo $(\frac{2}{3}) = -1$ i $(\frac{-1}{3}) = -1$. Dakle, $(\frac{-8}{3}) = 1$.

4.2 Kvadratni zakon reciprociteta

Iako smo pokazali nekoliko rezultata pomoću kojih se mogu odrediti Legendreovi simboli, eksplicitno izračunavanje ovih simbola i dalje ostaje komplikiran postupak, osobito ako su uključeni veći brojevi. Npr. s komplificiranim postupkom se susrećemo već i prilikom ispitivanja je li 67 kvadratni ostatak modulo 151. Najveći korak prema pojednostavljenju tog postupka je dan upravo kvadratnim zakonom reciprociteta, dubokim rezultatom do kojeg je došao još Gauss. Jednako kao što se Pitagorin teorem može smatrati fundamentalnim rezultatom u geometriji, kvadratni zakon reciprociteta se danas može smatrati ključnim teoremom u teoriji brojeva, koji se pojavljuje kad god se proučavaju kvadratne diofantske jednadžbe. Upravo iz tog razloga je do danas konstruirano mnogo bitno različitih dokaza kvadratnog zakona reciprociteta (do 2000. ih je bilo poznato ukupno 196).

Na ovom mjestu ćemo izvesti dokaz kvadratnog reciprociteta koji se temelji na množenju elemenata koji posjeduju multiplikativni inverz modulo produkt dva različita prosti broja. U tome će osnovni korak predstavljati idući tehnički rezultat:

Lema 4.2.1. *Neka su p i q međusobno različiti prosti brojevi. Tada je*

$$\prod_{\substack{x \text{ invertibilan modulo } pq \\ 1 \leq x \leq \frac{pq-1}{2}}} (x, x) \equiv \left((-1)^{\frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p} \right), (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{q} \right) \right) (\text{mod } p, \text{mod } q).$$

Dokaz. Promotrimo invertibilne elemente modulo pq , što su upravo oni elementi koji nisu djeljivi niti s p niti s q . Skup invertibilnih elementa x koji se nalaze u $\{1, 2, \dots, \frac{pq-1}{2}\}$, promatran modulo p , se sastoji od $\frac{q-1}{2}$ nizova $1, 2, \dots, p-1$ te niza $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$, gdje još treba isključiti niz $q, 2q, \dots, \frac{p-1}{2}q$ koji se sastoji od višekratnika broja q . Na taj način dobivamo

$$\begin{aligned} \prod_{\substack{x \text{ invertibilan modulo } pq \\ 1 \leq x \leq \frac{pq-1}{2}}} x &\equiv (p-1)!^{\frac{q-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2} \right)! / q^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2} \right)! \pmod{p} \\ &\equiv (-1)^{\frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p} \right) \pmod{p}, \end{aligned}$$

jer se $\left(\frac{p-1}{2} \right)!$ dokida, $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ prema Wilsonovu teoremu te $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p} \right) \pmod{p}$.

Na isti način dobivamo i

$$\prod_{\substack{x \text{ invertibilan modulo } pq \\ 1 \leq x \leq \frac{pq-1}{2}}} x \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{q} \right) \pmod{q},$$

čime je lema dokazana. \square

Teorem 4.2.2 (Kvadratni zakon reciprociteta). *Neka su p i q različiti neparni prosti brojevi. Tada vrijedi*

$$\left(\frac{p}{q} \right) \left(\frac{q}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Dokaz. Kako bi dokazali ovaj važan rezultat, produkt

$$\prod_{\substack{x \text{ invertibilan modulo } pq \\ 1 \leq x \leq \frac{pq-1}{2}}} (x, x) \pmod{p, \text{ mod } q}$$

iz prethodne leme ćemo izraziti isključivo pomoću potencija od -1 .

Primijetimo da se za svaki $x \in \{1, 2, \dots, pq-1\}$ točno jedan element skupa $\{x, -x\} \pmod{pq}$ pojavljuje u nizu $1, 2, \dots, \frac{pq-1}{2}$. Prema tome, među odgovarajućim uređenim parovima ostataka $(a, b) = (x \pmod{p}, x \pmod{q})$ pojavljuje se točno jedan od parova $(a, b), (-a, -b)$. Točno po jedan od svakog mogućeg para ostataka $\pmod{p, \text{ mod } q}$ dobivamo uzimajući $1 \leq a \leq p-1$ i $1 \leq b \leq \frac{q-1}{2}$. Na taj način dobivamo

$$\prod_{\substack{x \text{ invertibilan modulo } pq \\ 1 \leq x \leq \frac{pq-1}{2}}} (x, x) \equiv \pm \left((p-1)!^{\frac{q-1}{2}}, ((q-1)/2)!^{p-1} \right) \pmod{p, \text{ mod } q} \quad (4.1)$$

jer se svaki $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ pojavljuje u točno $\frac{q-1}{2}$ parova, dok se svaki $b \in \{1, 2, \dots, \frac{q-1}{2}\}$ pojavljuje u točno $p-1$ parova.

Pomoću Wilsonova teorema ćemo potencije faktorijela koje se pojavljuju u (4.1) prikazati kao potencije od -1 . Kako je $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$, prva komponenta

je kongruentna $(-1)^{\frac{q-1}{2}}$ modulo p . Kako bi prikazali i drugu komponentu u obliku potencije od -1 , primijetimo da vrijedi

$$\begin{aligned} -1 &\equiv (q-1)! \pmod{q} \\ &\equiv 1 \cdot 2 \cdots (q-1)/2 \cdot ((q-1)/2) \cdots (-2) \cdot (-1) \pmod{q} \\ &\equiv ((q-1)/2)!^2 (-1)^{\frac{q-1}{2}} \pmod{q}. \end{aligned}$$

Prema tome je

$$((q-1)/2)!^2 \equiv (-1)(-1)^{\frac{q-1}{2}} \pmod{q}.$$

Potenciranjem dobivamo

$$((q-1)/2)!^{p-1} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \pmod{q}$$

te kongruencija (4.1) prelazi u

$$\prod_{\substack{x \text{ invertibilan modulo } pq \\ 1 \leq x \leq \frac{pq-1}{2}}} (x, x) \equiv \pm((-1)^{\frac{q-1}{2}}, ((-1)^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}})) \pmod{p, q} \quad (4.2)$$

Izjednačavanjem kongruencije (4.2) i rezultata iz Leme 4.2.1 dobivamo da vrijedi jedno od idućeg:

- $\left(\frac{q}{p}\right) = 1$ i $\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$,
- $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ i $\left(\frac{p}{q}\right) = -(-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$,

iz čega slijedi

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

□

Primjer 30. Odredimo $\left(\frac{67}{151}\right)$.

Primjenom kvadratnog zakona reciprociteta dobivamo

$$\left(\frac{67}{151}\right) = -\left(\frac{151}{67}\right) = -\left(\frac{17}{67}\right) = -\left(\frac{67}{17}\right) = -\left(\frac{16}{17}\right) = -1.$$

Pokažimo i još jednu primjenu kvadratnog zakona reciprociteta. Podsjetimo se kako smo u prvom poglavlju definirali n -ti Fermatov broj F_n s $F_n = 2^{2^n} + 1$. Idućim rezultatom je dan efikasan kriterij za ispitivanje prostosti Fermatovih brojeva.

Propozicija 4.2.3. Fermatov broj F_n je prost ako i samo ako vrijedi

$$3^{\frac{F_n-1}{2}} \equiv -1 \pmod{F_n}.$$

Dokaz. Pokažimo samo nužnost. Dakle, neka je F_n prost.

Po Eulerovom kriteriju vrijedi $3^{\frac{F_n-1}{2}} \equiv \left(\frac{3}{F_n}\right) \pmod{F_n}$.

Prema tome, dovoljno je dokazati da 3 nije kvadratni ostatak modulo F_n . Kako je $F_n - 1$ djeljiv s 4 , kvadratni zakon reciprociteta povlači $\left(\frac{3}{F_n}\right) = \left(\frac{F_n}{3}\right)$.

Nadalje je $F_n \equiv (-1)^{2^n} + 1 \pmod{3}$, tj. $F_n \equiv 2 \pmod{3}$, pa je $\left(\frac{F_n}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$.

Prema tome, 3 nije kvadratni ostatak modulo F_n . □

4.3 Jacobijev simbol

Jacobijev simbol je direktna generalizacija Legendreova simbola. Neka je P neparan prirodan broj te zapišimo P u obliku $P = p_1 p_2 \cdots p_n$, gdje su p_1, p_2, \dots, p_n prosti brojevi.

Jacobijev simbol $(\frac{a}{P})$ je definiran s $(\frac{a}{P}) = (\frac{a}{p_1})(\frac{a}{p_2}) \cdots (\frac{a}{p_n})$, gdje je $(\frac{a}{p_i})$ Legendreov simbol.

Ako je P prost, tada se Jacobijev i Legendreov simbol podudaraju. Ako a i P nisu relativno prosti, tada je $(\frac{a}{P}) = 0$, inače je jednako 1 ili -1 .

Nedostatak Jacobijeva simbola se nalazi u tome što $(\frac{a}{P}) = 1$ ne znači da je a kvadratni ostatak modulo P , što se može vidjeti iz primjera $(\frac{2}{15}) = 1$, no jednadžba $x^2 \equiv 2 \pmod{15}$ nema rješenja. Štoviše, a je kvadratni ostatak modulo P ako i samo ako je a kvadratni ostatak modulo p_i , za sve $1 \leq i \leq n$.

Direktno iz dokazanih svojstava Legendreova simbola se dobivaju i analogna svojstva Jacobijeva simbola:

Propozicija 4.3.1. *Neka su a i b cijeli brojevi te P_1 i P_2 neparni prirodni brojevi.*

Tada vrijedi:

- (1) $(\frac{a}{P_1 P_2}) = (\frac{a}{P_1})(\frac{a}{P_2})$,
- (2) $(\frac{ab}{P_1}) = (\frac{a}{P_1})(\frac{b}{P_1})$,
- (3) ako je $a \equiv b \pmod{P_1}$, tada vrijedi $(\frac{a}{P_1}) = (\frac{b}{P_1})$,
- (4) ako je $(a, P_1) = 1$, tada vrijedi $(\frac{a^2}{P_1}) = (\frac{a}{P_1^2}) = 1$,
- (5) $(\frac{-1}{P_1}) = (-1)^{\frac{P_1-1}{2}}$, $(\frac{2}{P_1}) = (-1)^{\frac{P_1^2-1}{8}}$,
- (6) ako je $(P_1, P_2) = 1$, tada vrijedi $(\frac{P_1}{P_2})(\frac{P_2}{P_1}) = (-1)^{\frac{P_1-1}{2} \cdot \frac{P_2-1}{2}}$.

Dokaz. Prokomentirajmo samo svojstvo (5): očito je $(\frac{-1}{P_1}) = (-1)^{\sum_{i=1}^n \frac{p_i-1}{2}}$, gdje je $P_1 = p_1 p_2 \cdots p_n$, p_i neparan prost za $i = 1, 2, \dots, n$.

Za neparne brojeve a, b vrijedi $\frac{ab-1}{2} \equiv \frac{a-1}{2} + \frac{b-1}{2} \pmod{2}$, jer je $\frac{ab-1}{2} - \frac{a-1}{2} - \frac{b-1}{2} = \frac{(a-1)(b-1)}{2}$, što je paran broj.

Induktivno slijedi $\sum_{i=1}^n \frac{p_i-1}{2} \equiv \frac{p_1 p_2 \cdots p_n - 1}{2} \equiv \frac{P_1 - 1}{2} \pmod{2}$. □

4.4 Primjena kvadratnih ostataka na diofantske jednadžbe

U ovom kratkom potpoglavlju ćemo prikazati neke primjene kvadratnih ostataka na rješavanje nekih specifičnih diofantskih jednadžbi.

Propozicija 4.4.1. *Diofantska jednadžba $x^2 + 3k + 1 = 0$ nema rješenja niti za jedan cijeli broj k .*

Dokaz. Prepostavimo da postoje cijeli brojevi x, k koji zadovoljavaju danu Diofantsku jednadžbu. Tada je $x^2 = -3k - 1$ pa vrijedi i $x^2 \equiv -3k - 1 \pmod{p}$ za svaki prost broj p .

Posebno, za $p = 3$ dobivamo $x^2 \equiv -1 \pmod{3}$ odakle slijedi da je -1 kvadratni ostatak modulo 3. No, Legendreov simbol $(\frac{-1}{3})$ je jednak -1 pa polazna jednadžba nema rješenja. \square

Teorem 4.4.2. *Neka je n prirodan broj. Diofantska jednadžba*

$$x^2 + 3y^2 = n$$

ima rješenja ako i samo ako u rastavu broja n na proste faktore svaki prost faktor oblika $3k - 1$ dolazi s parnom potencijom.

Dokaz. Pretpostavimo najprije da jednadžba iz iskaza teorema ima rješenja te neka n ima neki prost faktor p oblika $3k - 1$, tj. neka je $p \equiv 2 \pmod{3}$.

Kako p dijeli n , dobivamo kongruenciju $x^2 + 3y^2 \equiv 0 \pmod{p}$ ili, ekvivalentno, $x^2 \equiv -3y^2 \pmod{p}$.

Iz prethodne kongruencije slijedi da ili p dijeli y ili je $-3y^2$ kvadratni ostatak modulo p . Pretpostavimo najprije da su p i y relativno prosti. Tada je Legendreov simbol $(\frac{-3y^2}{p})$ jednak 1. Odatle je i $(\frac{-3}{p}) = 1$.

Nadalje, imamo $(\frac{-3}{p}) = (\frac{-1}{p})(\frac{3}{p}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}(\frac{3}{p})$. Iz $(\frac{-3}{p}) = 1$ dobivamo $(\frac{3}{p}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$. Kvadratni zakon reciprociteta pokazuje

$$\left(\frac{3}{p}\right)\left(\frac{p}{3}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

Odatle je $(\frac{p}{3}) = 1$, što povlači $p \equiv 1 \pmod{3}$, suprotno polaznoj pretpostavci.

Prema tome, p dijeli y , no p^2 dijeli i x^2 i y^2 pa p^2 dijeli i $x^2 + 3y^2 = n$. Dijeljenjem polazne jednadžbe s p^2 dobivamo novu jednadžbu $(\frac{x}{p})^2 + 3(\frac{y}{p})^2 = \frac{n}{p^2}$, te indukcijom slijedi da p u rastavu broja n na proste faktore dolazi s parnom potencijom.

Pokažimo sada i dovoljnost. U tu svrhu, primijetimo najprije da se prost broj p može prikazati u obliku $p = x^2 + 3y^2$ ako i samo ako je $p = 3$ ili $p \equiv 1 \pmod{3}$. Zaista, $3 = 0^2 + 3 \cdot 1^2$. Nadalje, pretpostavimo $p > 3$ i $p = x^2 + 3y^2$. Očito vrijedi $(p, x) = (p, y) = 1$ pa postoji multiplikativni inverz y' od y modulo p . Iz kongruencije $x^2 \equiv -3y^2 \pmod{p}$ slijedi $(xy')^2 \equiv -3 \pmod{p}$. Sada iz $(xy', 3) = 1$ slijedi $(\frac{-3}{p}) = 1$ ili, ekvivalentno tome, $(\frac{3}{p}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$. Korištenjem kvadratnog zakona reciprociteta na isti način kao i prije dobivamo $p \equiv 1 \pmod{3}$.

Obratno, neka je p prost broj oblika $3k+1$. Tada postoji cijeli broj a za koji vrijedi $a^2 \equiv -3 \pmod{p}$.

Očito je $(a, p) = 1$ te za $b = \lfloor \sqrt{p} \rfloor$ vrijedi $(b+1)^2 > p$. Postoji $(b+1)^2$ parova $(u, v) \in \{0, 1, \dots, b\} \times \{0, 1, \dots, b\}$ i $(b+1)^2$ cijelih brojeva oblika $au + v$, gdje je $u, v \in \{0, 1, \dots, b\}$. Odatle dobivamo različite parove (u_1, v_1) i (u_2, v_2) za koje vrijedi $au_1 + v_1 \equiv au_2 + v_2 \pmod{p}$. Pretpostavimo da je $u_1 \geq u_2$ te neka je $x = u_1 - u_2$ i $y = |v_1 - v_2|$. Dobivamo $0 < x, y \leq b < \sqrt{p}$ i $ax + y \equiv 0 \pmod{p}$.

Prema tome, postoji cijeli brojevi x i y takvi da je $0 < x, y < \sqrt{p}$ i $p | a^2x^2 - y^2$. Sada direktno slijedi

$$p | (a^2 + 3)x^2 - (3x^2 + y^2),$$

tj. $3x^2 + y^2 = lp$ za neki prirodan broj l . Iz nejednakosti $0 < x^2 < p$ i $0 < y^2 < p$ slijedi $l \in \{1, 2, 3\}$.

Promotrimo sada dobivene mogućnosti:

- $l = 1$: dobivamo $p = 3x^2 + y^2$.
- $l = 2$: dobivamo jednakost $2p = 3x^2 + y^2$ koja nije moguća, jer iz nje slijedi da su x i y iste parnosti odakle je $2p$ djeljivo s 4, suprotno pretpostavci.
- $l = 3$: dobivamo jednakost $3p = 3x^2 + y^2$ iz koje slijedi da se y može zapisati u obliku $y = 3y_1$ odakle je $p = x^2 + 3y_1^2$.

Neka je, napokon, n oblika a^2b , gdje je b kvadratno slobodan. Iz pretpostavke teorema slijedi $b = \prod_{i=1}^m p_i$ gdje je ili $p_i = 3$ ili $p_i \equiv 1 \pmod{3}$ za $i = 1, 2, \dots, m$. Tada se svaki p_i može zapisati u obliku $p_i = x_i^2 + 3y_i^2$ te iz jednakosti $(x_i^2 + 3y_i^2)(x_j^2 + 3y_j^2) = (x_i x_j + 3y_i y_j)^2 + 3(x_i y_j - x_j y_i)^2$ slijedi $b = x^2 + 3y^2$. Konačno, $n = a^2b = (ax)^2 + 3(ay)^2$.

□

Primijetimo kako prethodni teorem možemo iskazati i na idući način: prirodan broj n se može prikazati u obliku $x^2 + 3y^2$, gdje su x i y cijeli brojevi, ako i samo ako se svaki prost faktor oblika $3k - 1$ u rastavu od n pojavljuje s parnom potencijom.

Poglavlje 5

GAUSSOVI CIJELI BROJEVI

Gaussovi cijeli brojevi predstavljaju proširenje skupa cijelih brojeva, koji je Gauss uveo prilikom proučavanja diofantskih jednadžbi oblika $x^2 + y^2 = n$, jer omogućuju faktorizaciju lijeve strane navedene jednadžbe. Kako ćemo i pokazati u ovom poglavlju, skup Gaussovih cijelih brojeva posjeduje i brojna svojstva skupa cijelih brojeva, koja omogućuju njegovu primjenu pri rješavanju različitih problema u teoriji brojeva. Upravo je preko Gaussovih cijelih brojeva uveden i pojam norme te pojmovi prostog, invertibilnog i asociranog elementa koji su danas standardni pojmovi u algebri i algebarskoj teoriji brojeva.

5.1 Skup $\mathbb{Z}[i]$

Gaussovi cijeli brojevi su kompleksni brojevi oblika $a + bi$, gdje su a, b cijeli brojevi. Skup Gaussovih cijelih brojeva se označava sa $\mathbb{Z}[i]$, dakle $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Primijetimo kako je svaki cijeli broj ujedno i Gaussov cijeli broj, jer je $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}[i]$. Također, neki cijeli brojevi se mogu zapisati u obliku produkta Gaussovih cijelih brojeva, kao npr. $5 = (2 + i)(2 - i)$ ili $50 = (4 - 3i)(8 + 6i)$.

Posebno, svaki prirodan broj n koji se može prikazati u obliku sume kvadrata dvaju cijelih brojeva x i y (tj. $n = x^2 + y^2$, kratko kažemo da je n suma dvaju kvadrata) se može zapisati u obliku produkta dvaju Gaussovih cijelih brojeva, jer vrijedi $x^2 + y^2 = (x + yi)(x - yi)$.

Na skupu Gaussovih cijelih brojeva definiramo normu $N(\alpha)$, za $\alpha = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ s $N(\alpha) = \alpha \cdot \bar{\alpha} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$.

Primijetimo kako je $N(\alpha)$ uvijek nenegativan cijeli broj, te je $N(\alpha) = 0$ ako i samo ako je $\alpha = 0$.

Osnovno svojstvo norme je njezina multiplikativnost:

Lema 5.1.1. Za $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ vrijedi $N(\alpha \cdot \beta) = N(\alpha)N(\beta)$.

Dokaz.

$$N(\alpha \cdot \beta) = (\alpha \cdot \beta)(\overline{\alpha \cdot \beta}) = (\alpha \cdot \beta)(\bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}) = (\alpha \cdot \bar{\alpha})(\beta \cdot \bar{\beta}) = N(\alpha)N(\beta).$$

□

Iz ove leme direktno slijedi i tzv. Diofantov identitet, koji govori kako je produkt suma dvaju kvadrata ponovno suma dvaju kvadrata:

$$(a_1^2 + b_1^2)(a_2^2 + b_2^2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2)^2 + (a_1 b_2 + b_1 a_2)^2. \quad (5.1)$$

Primijetimo kako je Diofantov identitet ustvari jednakost $N(a_1 + b_1 i)N(a_2 + b_2 i) = N((a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i))$, koju smo dokazali u Lemi 5.1.1.

Primjer 31. *Idući prikazi brojeva u obliku sume dvaju kvadrata su očiti: $13 = 2^2 + 3^2$, $25 = 3^2 + 4^2$, no tada vrijedi i*

$$325 = 13 \cdot 25 = (2^2 + 3^2)(3^2 + 4^2) = (2 \cdot 3 - 3 \cdot 4)^2 + (2 \cdot 4 + 3 \cdot 3)^2 = 6^2 + 17^2.$$

Napomenimo da smo normu mogli definirati i općenito za proizvoljan kompleksan broj z pomoću $N(z) = z \cdot \bar{z}$. Također, tada za $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ vrijedi $N(z_1 z_2) = N(z_1)N(z_2)$.

Element $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ nazivamo *invertibilnim* ukoliko postoji $\beta \in \mathbb{Z}[i]$ takav da je $\alpha \cdot \beta = 1$. Takav element β , ukoliko postoji, se obično označava s α^{-1} .

Propozicija 5.1.2. *Gaussov cijeli broj α je invertibilan ako i samo ako je norme jednake 1. Prema tome, jedini invertibilni Gaussovi cijeli brojevi su $1, -1, i, -i$.*

Dokaz. Neka je najprije $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ invertibilan. Očito je tada $\alpha \neq 0$. Tada postoji $\alpha^{-1} \in \mathbb{Z}[i]$ takav da vrijedi $\alpha \cdot \alpha^{-1} = 1$. Uzimajući normu lijeve i desne strane prethodne jednakosti te koristeći Lemu 5.1.1, dobivamo $N(\alpha)N(\alpha^{-1}) = 1$. Kako su $N(\alpha)$ i $N(\alpha^{-1})$ prirodni brojevi, slijedi $N(\alpha) = 1$.

Neka je sada α Gaussov cijeli broj norme 1. Tada je $\alpha \cdot \bar{\alpha} = N(\alpha) = 1$ pa je α invertibilan.

Ako je $\alpha = a + bi$ Gaussov cijeli broj norme 1, tada je $a^2 + b^2 = 1$. Možemo zaključiti $a, b \in \{0, 1, -1\}$, $a \neq b$ i $a \cdot b = 0$. Odatle direktno slijedi posljednja tvrdnja propozicije. □

5.2 Djeljivost i prosti elementi u $\mathbb{Z}[i]$

Kažemo da Gaussov cijeli broj β , različit od nule, dijeli Gaussov cijeli broj α ako postoji Gaussov cijeli broj γ takav da je $\alpha = \beta \cdot \gamma$.

Na primjer, $4 - 3i$ dijeli 25 , jer je $25 = (4 - 3i)(4 + 3i)$.

Ako β dijeli α , tada očito i $N(\beta)$ dijeli $N(\alpha)$. Prema tome, npr. $4 + i$ ne može dijeliti $2 - 3i$. Dakle, na određen način se pitanje o djeljivosti u $\mathbb{Z}[i]$ često reducira na pitanje djeljivosti u \mathbb{Z} .

Upravo iz toga razloga definiramo da je Gaussov cijeli broj *prost* ako se ne može prikazati u obliku produkta Gaussovinih cijelih brojeva manje norme.

Primjer 32. *$3 + 2i$ je prost Gaussov cijeli broj, jer je $N(3 + 2i) = 3^2 + 2^2 = 13$, koji je prost broj.*

2 nije prost Gaussov cijeli broj, jer je $2 = (1+i)(1-i)$, a $1+i, 1-i$ su oba norme 2 dok je 2 norme 4 . Primijetimo da su $1-i, 1+i$ prosti Gaussovi cijeli brojevi, pa su oni upravo prosti faktori broja 2 u $\mathbb{Z}[i]$.

Propozicija 5.2.1. *Svaki Gaussov cijeli broj se može prikazati kao produkt prostih Gaussovih cijelih brojeva.*

Dokaz. Dokaz je sličan dokazu analognog svojstva prirodnih brojeva.

Dakle, neka je α Gaussov cijeli broj. Ako je α prost, tada smo gotovi. Ako α nije prost, tada postoje $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[i]$, norme manje od α , takvi da je $\alpha = \beta \cdot \gamma$.

Ako β i γ nisu oba prosti, na isti način ih prikažemo u obliku produkta Gaussovih cijelih brojeva manje norme te nastavimo na isti način. Kako su norme prirodni brojevi i smanjuju se u svakom koraku, ovaj postupak mora stati nakon konačno mnogo koraka. Time dobivamo traženu faktorizaciju od α .

□

Još preostaje prokomentirati jedinstvenost ovakve faktorizacije. U slučaju prirodnih brojeva, jedinstvenost dokazanu u Osnovnom teoremu aritmetike (Teorem 1.4.3) se oslanjala na Euklidov algoritam, osnovna činjenica za čiji dokaz je bilo dana Teoremom o dijeljenju s ostatkom (Teorem 1.1.2).

Što se faktorizacije u $\mathbb{Z}[i]$ tiče, jedinstvena je do na poredak faktora i množenje faktora invertibilnim elementima. Na primjer, $2 = (1-i)(1+i) = (1+i)(1-i) = (-1+i)(-1-i)$. Iz tog razloga kažemo da su Gaussovi cijeli brojevi α, β relativno prosti ako su im jedini zajednički djelitelji upravo invertibilni elementi. Npr. $2+3i$ i $2-3i$ su relativno prosti.

Osim toga, najveći zajednički djelitelj Gaussovih cijelih brojeva α i β je svaki Gaussov cijeli broj γ sa svojstvom da iz $\delta \mid \alpha$ i $\delta \mid \beta$ slijedi $\delta \mid \gamma$. Analogan način za definirati najveći zajednički djelitelj Gaussovih cijelih brojeva α i β je reći da je to njihov zajednički djelitelj najveće norme.

Ukoliko je γ najveći zajednički djelitelj Gaussovih cijelih brojeva α i β , direktno iz definicije slijedi da su $-\gamma, i \cdot \gamma$ te $-i \cdot \gamma$ također najveći zajednički djelitelji od α i β .

Za dokaz jedinstvenosti faktorizacije nam je najprije potreban analogon Teorema o dijeljenju s ostatkom za Gaussove cijele brojeve:

Teorem 5.2.2. *Za $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i], \beta \neq 0$, postoje $\gamma, \delta \in \mathbb{Z}[i]$ takvi da je $\alpha = \gamma \cdot \beta + \delta$ te $N(\delta) < N(\beta)$.*

Dokaz. Gaussov cijeli broj γ definiramo kao najbolju aproksimaciju kompleksnog razlomka $\frac{\alpha}{\beta}$, dobivenu zaokruživanjem realnog i imaginarnog dijela na najbliži cijeli broj, posebno 0.5 na 1 i -0.5 na 0 .

Nakon toga, definiramo $\delta = \alpha - \beta \cdot \gamma$.

Na primjer, uzimimo $\alpha = 5+7i$ te $\beta = 2+i$. Tada je

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{5+7i}{2+i} = \frac{17}{5} + \frac{9}{5}i$$

te je $\gamma = 3+2i$. Dalje je $\delta = 5+7i - (2+i)(3+2i) = 1$ te $N(1) = 1 < N(2+i) = 5$.

Provjerimo da $N(\delta) < N(\beta)$ vrijedi i općenito. Primijetimo da je $\frac{\alpha}{\beta} - \gamma = x + yi$, gdje je $|x|, |y| \leq \frac{1}{2}$.

Iz definicije od δ slijedi $N(\delta) = N(\alpha - \beta \cdot \gamma) = N(\frac{\alpha}{\beta} - \gamma)N(\beta)$ pa je $\frac{N(\delta)}{N(\beta)} = N(\frac{\alpha}{\beta} - \gamma) = N(x + yi) = x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}$.

Odatle je $N(\delta) \leq \frac{N(\beta)}{2} < N(\beta)$. \square

Korištenjem prethodnog teorema, na isti način kao u prvom poglavlju, dobivamo:

- Euklidov algoritam za Gaussove cijele brojeve,
- prikaz najvećeg zajedničkog djelitelja Gaussovih cijelih brojeva α, β u obliku $\gamma \cdot \alpha + \delta \cdot \beta$, za neke Gaussove cijele brojeve γ, δ ,
- ako prost Gaussov cijeli broj β dijeli produkt $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_n$, tada β dijeli α_i za neki $i \in \{1, 2, \dots, n\}$,
- jedinstvenost prikaza Gaussovih cijelih brojeva u obliku produkta prostih Gaussovih cijelih brojeva, do na poredak i množenje invertibilnim elementima, tj. elementima norme 1.

Pokažimo sada i neke rezultate koji povezuju proste prirodne brojeve i proste Gaussove cijele brojeve.

Propozicija 5.2.3. *Prost prirodan broj p je prost Gaussov cijeli broj ako i samo ako p nije suma dva kvadrata.*

Dokaz. Ako je $p = a^2 + b^2$, za neke $a, b \in \mathbb{Z}$, tada je $p = (a - bi)(a + bi)$. Kako je $N(a \pm bi) = p < N(p) = p^2$, p nije prost Gaussov cijeli broj.

Neka je sada p prost prirodan broj koji nije prost u $\mathbb{Z}[i]$. Tada postoji faktorizacija $p = (a+bi)\gamma$, gdje su $a+bi, \gamma$ Gaussovi cijeli brojevi norme manje od p^2 . Konjugiranjem dobivamo $p = (a - bi)\bar{\gamma}$, te množenjem prethodnih izraza $p^2 = (a^2 + b^2)N(\gamma)$.

Kako su $a^2 + b^2$ i $N(\gamma)$ prirodni brojevi veći od 1, a p prost, slijedi $p = a^2 + b^2$. \square

Primijetimo da su faktori $a - bi, a + bi$ prostog prirodnog broja p prosti Gaussovi cijeli brojevi, jer im je norma jednaka p . U idućoj propoziciji ćemo dokazati da se svi prosti Gaussovi cijeli brojevi pojavljuju na taj način.

Propozicija 5.2.4. *Prosti Gaussovi cijeli brojevi $a + bi$, gdje je $a \cdot b \neq 0$, su faktori prostih prirodnih brojeva p oblika $a^2 + b^2$.*

Dokaz. Ako je $a + bi$ prost Gaussov cijeli broj, tada je i $a - bi$ prost (inače bi rastav $a - bi = \alpha \cdot \beta$ davao rastav $a + bi = \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}$).

Nadalje, $(a + bi)(a - bi)$ je jedinstven rastav od $p = a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$ u produkt prostih Gaussovih cijelih brojeva. Ako p nije prost, tada postoji i rastav $p = rs$, $r, s \in \mathbb{N}$, $1 < r, s < p$, što nije moguće, jer bi na taj način dobili još neki rastav u produkt prostih Gaussovih cijelih brojeva. \square

5.3 Prikazi prirodnih brojeva u obliku sume dvaju kvadrata

Ukoliko je p prost prirodan broj oblika $4k + 3$, korištenjem kongruencija modulo 4 se lako može vidjeti kako se p ne može prikazati u obliku sume dvaju kvadrata (jer za svaki prirodan broj n vrijedi $n^2 \equiv 0$ ili $1 \pmod{4}$). Preostaje vidjeti što se može reći za proste brojeve oblika $4k + 1$.

Pokažimo najprije korisnu lemu:

Lema 5.3.1 (Lagrange). *Prost broj $p \in \mathbb{N}$ oblika $4k + 1$ dijeli $n^2 + 1$ za neki cijeli broj n .*

Dokaz. Primjenom Wilsonova teorema dobivamo:

$$\begin{aligned} -1 &\equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 4k \pmod{p} \\ &\equiv (1 \cdot 2 \cdots 2k)((2k+1) \cdot (2k+2) \cdots 4k) \pmod{p} \\ &\equiv (1 \cdot 2 \cdots 2k)((-2k) \cdot (-2k-1) \cdots (-1)) \pmod{p} \\ &\equiv (1 \cdot 2 \cdots 2k)^2(-1)^{2k} \pmod{p} \\ &\equiv (1 \cdot 2 \cdots 2k)^2 \pmod{p} \end{aligned}$$

Stavimo li $n = (2k)!$, dobivamo $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$ pa p dijeli $n^2 + 1$. \square

Teorem 5.3.2 (Fermat). *Svaki prost broj p oblika $4k + 1$ se može prikazati u obliku sume kvadrata dvaju cijelih brojeva.*

Dokaz. Neka je $n \in \mathbb{Z}$ takav da p dijeli $n^2 + 1$, takav n postoji prema prethodnoj lemi. U $\mathbb{Z}[i]$ vrijedi $n^2 + 1 = (n-i)(n+i)$.

Iako p dijeli $n^2 + 1$, p ne dijeli niti $n-i$ niti $n+i$, jer $\frac{n}{p} - \frac{i}{p}$ i $\frac{n}{p} + \frac{i}{p}$ nisu Gaussovi cijeli brojevi. No, tada p nije prost Gaussov cijeli broj. Sada Propozicija 5.2.3 pokazuje da je p oblika $p = a^2 + b^2$ za neke cijele brojeve a, b . \square

Teorem 5.3.3. *Prirodan broj n se može prikazati u obliku sume kvadrata dvaju cijelih brojeva ako i samo ako se svaki prost faktor oblika $4k + 3$ u rastavu od n pojavljuje s parnom potencijom.*

Dokaz. Neka je najprije $n = x^2 + y^2$ te neka je $p \in \mathbb{N}$ prost faktor broja n oblika $4k + 3$. Tada je $x^2 \equiv -y^2 \pmod{p}$. Nastavljamo slično kao u dokazu Teorema 4.4.2: pretpostavimo da p ne dijeli y , tada je Legendreov simbol $(\frac{-y^2}{p})$ jednak 1 te i $(\frac{-1}{p}) = 1$, što nije moguće prema Propoziciji 4.1.4.

Prema tome, $p \mid y$ pa $p^2 \mid x^2 + y^2 = n$. Dijeljenjem s p^2 dobivamo novu jednakost $(\frac{x}{p})^2 + (\frac{y}{p})^2 = \frac{n}{p^2}$ te induktivno slijedi da se p pojavljuje u rastavu broja n na proste faktore s parnom potencijom.

Sada pretpostavimo kako se svaki prost broj oblika $4k + 3$ u rastavu od n pojavljuje s parnom potencijom. Prema tome, n možemo zapisati u obliku $n = p_1 p_2 \cdots p_l n_1^2$, gdje su p_1, p_2, \dots, p_l međusobno različiti prosti brojevi, od kojih je najviše jedan jednak 2, dok za ostale vrijedi $p_i \equiv 1 \pmod{4}$.

Iz Teorema 5.3.2 i činjenice da je $2 = 1^2 + 1^2$ slijedi da se svaki od prostih brojeva p_1, p_2, \dots, p_l može prikazati u obliku sume kvadrata dvaju cijelih brojeva pa iz Diofantova identiteta (5.1) slijedi da se i broj n može prikazati u obliku sume kvadrata dvaju cijelih brojeva. \square

5.4 Pitagorine trojke

Uređenu trojku prirodnih brojeva (x, y, z) nazivamo *Pitagorina trojka* ako vrijedi

$$x^2 + y^2 = z^2,$$

tj. ako su x i y katete, a z hipotenuza pravokutnog trokuta. Ako su x, y, z relativno prosti, kažemo da je (x, y, z) *primitivna* Pitagorina trojka.

Primjer 33. $(3,4,5)$ je primitivna Pitagorina trojka.

Najprije ćemo promatrati isključivo primitivne Pitagorine trojke, iz kojih se lako dobiju i ostale Pitagorine trojke.

Kako su kvadrati parnih brojeva kongruentni 0 modulo 4, a kvadrati neparnih prirodnih brojeva kongruentni 1 modulo 4, u svakoj primitivnoj Pitagorinoj trojci je točno jedan od brojeva x, y paran, dok je z neparan.

U $\mathbb{Z}[i]$ identitet $x^2 + y^2 = z^2$ možemo zapisati u obliku $(x - yi)(x + yi) = z^2$. Vezano uz ovaj identitet, pokažimo iduće rezultate:

Lema 5.4.1. *Ako je (x, y, z) primitivna Pitagorina trojka, tada su $x - yi$ i $x + yi$ relativno prosti Gaussovi cijeli brojevi.*

Dokaz. Ako je $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ zajednički djelitelj Gaussovih cijelih brojeva $x - yi$ i $x + yi$, tada je i $\bar{\alpha}$ zajednički djelitelj tih brojeva (primjetimo da iz uvjeta $(x, y) = 1$ slijedi da α nije cijeli broj). No, tada je produkt $\alpha \cdot \bar{\alpha}$, koji je prirodan broj, djelitelj od $(x - yi)(x + yi)$.

Kako svaki zajednički djelitelj Gaussovih cijelih brojeva $x - yi$ i $x + yi$ dijeli njihovu sumu $2x$ te njihovu razliku $2yi$, slijedi kako su svi zajednički prosti djelitelji od $x - yi$ i $x + yi$ sadržani među prostim Gaussovim cijelim brojevima $\pm 1 \pm i$ koji dijele 2. No, kako je $(x - yi)(x + yi) = z^2$, gdje je z neparan, slijedi da niti jedan Gaussov cijeli broj oblika $\pm 1 \pm i$ ne dijeli desnu stranu prethodne jednakosti pa su $x - yi$ i $x + yi$ relativno prosti. \square

Lema 5.4.2. *Neka su $x - yi$, $x + yi$ relativno prosti Gaussovi cijeli brojevi takvi da je $(x - yi)(x + yi) = z^2$, za neki $z \in \mathbb{Z}[i]$, tada postoji $u_1, u_2, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, u_1, u_2 invertibilni, takvi da je $x - yi = u_1\alpha^2$ te $x + yi = u_2\beta^2$. Drugim riječima, relativno prosti faktori kvadrata su kvadrati pomnoženi invertibilnim elementima.*

Dokaz. Kako se u rastavu od z^2 svaki prost faktor pojavljuje s parnom potencijom, a $x - yi$, $x + yi$ nemaju zajedničkih prostih faktora, također se i svaki prost faktor od $x - yi$, $x + yi$ mora pojaviti s parnom potencijom. Produkt parnih potencija prostih faktora je očito potpun kvadrat. Kako su preostali faktori koji se mogu pojaviti jedino

invertibilni elementi, $x - yi$, $x + yi$ se mogu prikazati u obliku produkata invertibilnih elemenata i potpunih kvadrata. \square

Prema prethodnim rezultatima, ako je (x, y, z) primitivna Pitagorina trojka, tada $x - yi$ ima jedan od sljedećih oblika:

$$(s - ti)^2, -(s - ti)^2, i(s - ti)^2, -i(s - ti)^2,$$

gdje su $s, t \in \mathbb{Z}$. Dakle, $x - yi$ je oblika:

$$(s^2 - t^2) - 2sti, t^2 - s^2 + 2sti, 2st + (s^2 - t^2)i, -2st + (t^2 - s^2)i.$$

Izjednačavanjem realnih i imaginarnih dijelova dobivamo da je jedan od brojeva x , y oblika $u^2 - v^2$, a drugi oblika $2uv$, za neke prirodne brojeve u, v . Očito je $u > v$.

Obično se uzima da je y paran, dakle $y = 2uv$. Kako su x, y relativno prosti (jer se radi o primitivnoj Pitagorinoj trojci), slijedi da su i u, v relativno prosti. Također, u i v su različite parnosti, jer bi inače x bio paran.

Iz identiteta $(u^2 - v^2)^2 + (2uv)^2 = (u^2 + v^2)^2$ proizlazi $z = u^2 + v^2$.

Teorem 5.4.3. *Ako je (x, y, z) primitivna Pitagorina trojka, tada postoje relativno prosti prirodni brojevi u, v različite parnosti, $u > v$, takvi da je $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$, $z = u^2 + v^2$.*

Sve Pitagorine trojke su dane identitetom

$$[d(u^2 - v^2)]^2 + (2duv)^2 = [d(u^2 + v^2)]^2, d \in \mathbb{N}. \quad (5.2)$$

Primjer 34. Odredite sve Pitagorine trojke u kojima je jedna stranica jednaka 14.

Iz identiteta (5.2) vidimo da je $d \in \{1, 2, 7, 14\}$. Primijetimo kako dijeljenjem s d dobivamo primitivnu Pitagorinu trojku. Promotrimo moguće slučajeve zasebno:

- $d = 14$: U ovom slučaju dijeljenjem s d dobivamo primitivnu Pitagorinu trojku čiji je jedan član jednak 1. No, kako je $u > v$, slijedi da je $1 = u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$, odakle slijedi $u - v = u + v = 1$, što nije moguće.
- $d = 7$: Sada dobivamo primitivnu Pitagorinu trojku čiji je član $y = 2uv$ jednak 2. Odatle slijedi $u = v = 1$ što ponovno nije moguće jer su u, v različite parnosti.
- $d = 2$: Dijeljenje s d vodi na primitivnu Pitagorinu trojku čiji je jedan član jednak 7. Prema Teoremu 5.3.3, 7 se ne može prikazati u obliku $u^2 + v^2$. Prema tome, $7 = u^2 - v^2 = (u - v)(u + v)$ pa je $u + v = 7$ i $u - v = 1$. Rješenje ovog sustava je $u = 4$, $v = 3$ te dobivamo Pitagorinu trojku (14, 48, 50).
- $d = 1$: Preostaje primitivna Pitagorina trojka s jednim članom jednakim 14. Dakle, $2uv = 14$, tj. $uv = 7$. No, kako su u i v različite parnosti, ovaj slučaj nije moguć.

Zaključimo ovo poglavlje posebnim slučajem Velikog Fermatova teorema. Započnimo idućom lemom, čiji dokaz koristi vrlo interesantnu metodu poznatu pod nazivom 'Fermatova metoda beskonačnog spusta'.

Lema 5.4.4. *Jednadžba $x^4 + y^4 = z^2$ nema rješenja u prirodnim brojevima.*

Dokaz. Pretpostavimo da postoji rješenje jednadžbe $x^4 + y^4 = z^2$ u prirodnim brojevima te neka je (x, y, z) trojka prirodna brojeva koja je rješenje s najmanjim z . Tada je (x^2, y^2, z) primitivna Pitagorina trojka, inače bi dijeljenjem s najvećim zajedničkim djeliteljem dobili rješenje s manjim z .

Dakle, postoje prirodni brojevi u, v takvi da je $x^2 = u^2 - v^2$, $y^2 = 2uv$, $z = u^2 + v^2$. Time dobivamo i novu primitivnu Pitagorinu trojku $x^2 + v^2 = u^2$, pa su y i v parni te možemo staviti $y = 2m$ i $v = 2n$. Uvrštavanjem u jednakost $y^2 = 2uv$ dobivamo $m^2 = un$. Kako su u i v relativno prosti, moraju i u i n biti relativno prosti pa su i potpuni kvadrati. Zapišimo ih u obliku $u = u_1^2$, $n = n_1^2$.

Iz primitivne Pitagorine trojke (x, v, u) slijedi da postoje i relativno prosti prirodni brojevi a, b takvi da je $x = a^2 - b^2$, $v = 2ab$, $u = a^2 + b^2$.

No, sada je, zbog $v = 2n = 2n_1^2$, $2ab = 2n_1^2$ pa je $ab = n_1^2$. Zbog $(a, b) = 1$, a i b su također potpuni kvadrati pa ih možemo zapisati u obliku $a = a_1^2$ i $b = b_1^2$. Uvrštavanjem u jednakost $u = a^2 + b^2$ dobivamo $a_1^4 + b_1^4 = u_1^2$. Kako je $u_1 < z$, dobivamo kontradikciju s minimalnošću od z . Dakle, polazna jednadžba nema rješenja u prirodnim brojevima.

□

Direktna posljedica prethodne leme je

Teorem 5.4.5. *Jednadžba $x^4 + y^4 = z^4$ nema rješenja u prirodnim brojevima.*

Poglavlje 6

PELLOVE JEDNADŽBE

Pellova jednadžba $x^2 - ny^2 = 1$, gdje je n prirodan broj koji nije potpun kvadrat, pripada među najstarije i najvažnije diofantske jednadžbe drugog reda, a jedini pravi suparnik joj u tome može biti Pitagorina jednadžba $x^2 + y^2 = z^2$, koju smo riješili u prethodnom poglavlju.

Pellova jednadžba ima dugu povijest, korijeni koje sežu još u doba antičke Grčke. Još je Teon iz Smirne koristio rješenja jednadžbe $x^2 - 2y^2 = 1$ kako bi racionalnim brojem $\frac{x}{y}$ aproksimirao $\sqrt{2}$. Općenito, Arhimed je primijetio da ako su x i y velika rješenja jednadžbe $x^2 - ny^2 = 1$, tada je $\frac{x}{y}$ dobra aproksimacija iracionalnog broja \sqrt{n} . Još je jedna čuvena Pellova jednadžba otkrivena od strane Arhimeda. Kako je otkriveno iz povjesnih izvora u 18. stoljeću, nakon što je Apolonij iz Perga kritizirao jedan od Arhimedovih radova, Arhimed u formi epigrama od 44 retka postavlja *problem stoke*. Ovaj računski izuzetno zahtjevan problem u kojem se traži prebrojavanje bikova različitih boja (i o kojem se više može naći u [4]) se bazira na sustavu sedam jednadžbi s osam nepoznanica, koji se svodi na Pellovu jednadžbu $x^2 - 4729494y^2 = 1$. Taj problem je Arhimed poslao Apoloniju, a tek je krajem 19. stoljeća otkriveno da u najmanjem rješenju ove jednadžbe y ima čak 41 znamenku.

Zatim se Pellova jednadžba pojavljuje i u indijskoj matematici. Najprije indijski matematičar Baudhayana otkriva da je $x = 577$, $y = 408$ rješenje jednadžbe $x^2 - 2y^2 = 1$ te koristi $\frac{577}{408}$ kako bi aproksimirao $\sqrt{2}$. Zatim u 7. stoljeću Brahmagupta dolazi do važnog pravila kojim se iz poznatih rješenja Pellove jednadžbe dobivaju i druga rješenja iste jednadžbe te pronalazi i rješenje jednadžbe $x^2 - 92y^2 = 1$ pri čemu naglašava kako se osoba koja ovaj problem riješi za manje od godinu dana može smatrati matematičarem. Konačno, u 12. stoljeću Bhaskara II. pronalazi najmanje rješenje jednadžbe $x^2 - 61y^2 = 1$ u prirodnim brojevima, koje je daleko veće od svih najmanjih rješenja u prirodnim brojevima jednadžbi $x^2 - ny^2 = 1$ za $n \leq 60$.

Navedena jednadžba dobiva današnji naziv nakon što se Euler susreo s Wallisovim djelom *Opera Mathematica* te greškom proglašio kako je prvi koji je ozbiljnije proučavao netrivijalna rješenja jednadžbe $x^2 - ny^2 = 1$ ($x \neq 1$, $y \neq 0$) upravo engleski matematičar John Pell. Ipak, ne postoje dokazi da se Pell ikada bavio jednadžbama ovog tipa. Posljednji koji se, prije Eulerova vremena, bavio ovakvim jednadžbama

je Fermat, koji je još 1657. bez dokaza obznanio tvrdnju da za prirodan broj n koji nije potpun kvadrat jednadžba $x^2 - ny^2 = 1$ ima beskonačno mnogo cijelobrojnih rješenja (ovu tvrdnju je dokazao Lagrange 1770.). Fermat je također izazvao poznate matematičare tog doba, Williama Brounckera i Johna Wallisa da pronađu cijelobrojna rješenja jednadžbi $x^2 - 151y^2 = 1$ i $x^2 - 313y^2 = 1$. Wallis je kratko odgovorio da je (1728148040, 140634693) rješenje prve jednadžbe, dok je Brouncker pronašao uređen par (126862368, 7170685) koji je rješenje druge jednadžbe. Sam Fermat je odbijao otkriti vlastitu metodu za rješavanje Pellove jednadžbe, no poznato je kako je znao da najmanje netrivijalno rješenje jednadžbe $x^2 - 109y^2 = 1$ u prirodnim brojevima glasi (158070671986249, 1514042455100). Nešto kasnije, tijekom 18. stoljeća se metode koje su razvili navedeni matematičari stupaju u jednostavniju metodu verižnih razlomaka, koje se može smatrati modifikacijom Euklidova algoritma za par $(\sqrt{n}, 1)$, a koju ćemo kratko opisati na kraju ovog poglavlja (svi detalji se mogu naći u [5]).

6.1 Osnovni pojmovi i egzistencija rješenja

Pellovom jednadžbom se naziva diofantska jednadžba oblika

$$x^2 - ny^2 = 1,$$

gdje je n prirodan broj koji nije potpun kvadrat. Neka otkriće u vezi ove jednadžbe su greškom od strane Eulera pripisana Johnu Pelli, koji nije značajnije pridonio u njenom rješavanju.

Općenito, jednadžbu oblika $x^2 - ny^2 = k$, gdje je k prirodan broj te n prirodan broj koji nije potpun kvadrat nazivamo *pellovska jednadžba*.

U antičkoj Grčkoj je proučavan specijalan slučaj Pellove jednadžbe za $n = 2$, u kojem rješenja ove jednadžbe u prirodnim brojevima pružaju dodatne informacije o prirodi iracionalnog broja $\sqrt{2}$. Postoji i slična veza između rješenja Pellove jednadžbe u prirodnim brojevima s iracionalnim brojem \sqrt{n} (podsjetimo, za $n \in \mathbb{N}$ vrijedi da je broj \sqrt{n} iracionalan ako i samo ako n nije potpun kvadrat):

Pretpostavimo da postoji niz proizvoljno velikih rješenja $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$ Pellove jednadžbe. Iz jednakosti $x_i^2 - ny_i^2 = 1$ slijedi $\frac{x_i^2}{y_i^2} = n + \frac{1}{y_i^2} \rightarrow n$ kada $y_i \rightarrow \infty$.

Prema tome, kvocijenti rješenja Pellove jednadžbe predstavljaju racionalne brojeve koji po volji dobro aproksimiraju iracionalan broj \sqrt{n} .

Kako ćemo vidjeti, upravo iracionalnost broja \sqrt{n} omogućuje dobivanje jednostavne relacije kojom se sva rješenja Pellove jednadžbe u prirodnim brojeva mogu prikazati u terminima najmanjeg rješenja u prirodnim brojevima. Primijetimo kako Pellova jednadžba ima i trivijalnih cijelobrojnih rješenja $x = \pm 1, y = 0$.

Prvi cilj nam je pokazati kako Pellova jednadžba zaista uvijek ima rješenja. Ključni korak u tome je dan idućim teoremom:

Teorem 6.1.1 (Dirichletov teorem o aproksimaciji). *Za svaki iracionalni broj oblika \sqrt{n} i prirodan broj B postoji cijeli brojevi a i b , $0 < b < B$ takvi da je*

$$|a - b\sqrt{n}| < \frac{1}{B}.$$

Dokaz. Neka je prirodan broj B proizvoljan, ali fiksiran. Promotrimo $B - 1$ brojeva $\sqrt{n}, 2\sqrt{n}, \dots, (B-1)\sqrt{n}$. Za svaki $k \in \{1, 2, \dots, B-1\}$ odaberimo cijeli broj A_k takav da je $0 < A_k - k\sqrt{n} < 1$.

Kako je \sqrt{n} iracionalan, niti jedan od brojeva $A_k - k\sqrt{n}$ ne može biti jednak 0 ili 1. Također, za $k_1 \neq k_2$ vrijedi $A_{k_1} - k_1\sqrt{n} \neq A_{k_2} - k_2\sqrt{n}$ (jer bi u suprotnom vrijedilo $\sqrt{n} = \frac{A_{k_1} - A_{k_2}}{k_2 - k_1}$).

Prema tome, u segmentu $[0, 1]$ imamo $B + 1$ različitih brojeva $0, A_1 - \sqrt{n}, A_2 - 2\sqrt{n}, \dots, A_{B-1} - (B-1)\sqrt{n}, 1$.

Podijelimo li segment $[0, 1]$ na B podintervala duljine $\frac{1}{B}$, prema Dirichletovom principu barem jedan podinterval sadrži barem dva od navedenih brojeva. Neka su to $A_i - i\sqrt{n}$ i $A_j - j\sqrt{n}$, $i \neq j$ (možemo uzeti da je $i < j$).

Tada je $|A_i - i\sqrt{n} - A_j + j\sqrt{n}| < \frac{1}{B}$ te za $a = A_i - A_j$ i $b = j - i$ vrijedi $|a - b\sqrt{n}| < \frac{1}{B}$. Iz $1 \leq i < j \leq B - 1$ slijedi $0 < b < B$.

□

Navedimo nekoliko direktnih posljedica prethodnog teorema:

- Kako prethodni teorem vrijedi za sve $B > 0$, možemo odabrati proizvoljno mali broj $\frac{1}{B}$, čime dobivamo nove vrijednosti za a i b . Prema tome, postoji beskonačno mnogo parova cijelih brojeva (a, b) takvih da je $|a - b\sqrt{n}| < \frac{1}{B}$. Iz $0 < b < B$ slijedi $|a - b\sqrt{n}| < \frac{1}{b}$.
- Očito je $|a + b\sqrt{n}| \leq |a - b\sqrt{n}| + |2b\sqrt{n}| \leq |3b\sqrt{n}|$ te $|a^2 - b^2 n| \leq \frac{1}{b} \cdot 3b\sqrt{n} = 3\sqrt{n}$. Prema tome, postoji beskonačno mnogo parova cijelih brojeva (a, b) takvih da je $|a^2 - nb^2| \leq 3\sqrt{n}$. Posebno, postoji beskonačno mnogo parova prirodnih brojeva (a_i, b_i) takvih da je $a_i^2 - nb_i^2 = N$, za neki prirodan broj N , $N < 3\sqrt{n}$.
- Postoje različiti parovi prirodnih brojeva (a_1, b_1) i (a_2, b_2) za koje vrijedi $a_1^2 - nb_1^2 = a_2^2 - nb_2^2 = N$, $a_1 \equiv a_2 \pmod{N}$ te $b_1 \equiv b_2 \pmod{N}$.

Sada možemo dokazati i egzistenciju rješenja Pelloove jednadžbe:

Teorem 6.1.2. *Neka je n prirodan broj koji nije potpun kvadrat. Tada Pellova jednadžba $x^2 - ny^2 = 1$ ima rješenja u prirodnim brojevima $(a, b) \neq (1, 0)$.*

Dokaz. Neka je $a - b\sqrt{n}$ kvocijent brojeva $a_1 - b_1\sqrt{n}$ i $a_2 - b_2\sqrt{n}$ dobivenih prije iskaza teorema. Tada je

$$a - b\sqrt{n} = \frac{a_1 - b_1\sqrt{n}}{a_2 - b_2\sqrt{n}} = \frac{(a_1 - b_1\sqrt{n})(a_2 + b_2\sqrt{n})}{a_2^2 - nb_2^2} = \frac{a_1 a_2 - nb_1 b_2}{N} + \frac{a_1 b_2 - b_1 a_2}{N}\sqrt{n}.$$

Očito je $a - b\sqrt{n} \neq \pm 1$.

Kako N dijeli $a_1^2 - nb_1^2$, dobivamo $a_1^2 - nb_1^2 \equiv 0 \pmod{N}$, odakle iz $a_1 \equiv a_2 \pmod{N}$ i $b_1 \equiv b_2 \pmod{N}$ slijedi $a_1 a_2 - nb_1 b_2 \equiv 0 \pmod{N}$.

Na isti način je i $a_1 b_2 - b_1 a_2 \equiv 0 \pmod{N}$ pa su $\frac{a_1 a_2 - nb_1 b_2}{N}$ i $\frac{a_1 b_2 - b_1 a_2}{N}$ cijeli brojevi.

Korištenjem identiteta $a_1^2 - nb_1^2 = a_2^2 - nb_2^2 = N$ jednostavnim računom dobivamo $a^2 - nb^2 = 1$ pa je parom (a, b) dano traženo rješenje. □

6.2 Struktura skupa rješenja Pellove jednadžbe

Najmanje netrivijalno rješenje Pellove jednadžbe često nije lako naći. U nekim slučajevima, to ipak nije pretežak posao, kao npr. za Pellove jednadžbe $x^2 - 2y^2 = 1$ i $x^2 - 3y^2 = 1$. Naime, najmanja rješenja ovih jednadžbi u prirodnim brojevima nisu prevelika, te su redom dana s $(x, y) = (3, 2)$ te $(x, y) = (2, 1)$.

No, napomenimo kako je najmanje rješenje jednadžbe $x^2 - 61y^2 = 1$ jednako $(x, y) = (1766319049, 226153980)$!

Osnovna važnost u poznavanju najmanjeg netrivijalnog rješenja leži u tome što ono daje odmah daje beskonačno mnogo rješenja:

Propozicija 6.2.1 (Brahmaguptino kompoziciono pravilo). *Ako su (x_1, y_1) i (x_2, y_2) rješenja Pellove jednadžbe $x^2 - ny^2 = 1$, tada je i $(x_3, y_3) = (x_1x_2 + ny_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$ takoder rješenje.*

Dokaz. Najprije primijetimo kako vrijedi $(x_1 + \sqrt{n}y_1)(x_2 + \sqrt{n}y_2) = x_1x_2 + ny_1y_2 + \sqrt{n}(x_1y_2 + x_2y_1)$.

Kako su (x_1, y_1) i (x_2, y_2) rješenja Pellove jednadžbe $x^2 - ny^2 = 1$, očito je $1 = (x_1^2 - ny_1^2)(x_2^2 - ny_2^2)$. Redom dobivamo

$$\begin{aligned} 1 &= (x_1 - \sqrt{n}y_1)(x_1 + \sqrt{n}y_1)(x_2 - \sqrt{n}y_2)(x_2 + \sqrt{n}y_2) \\ &= (x_1 - \sqrt{n}y_1)(x_2 - \sqrt{n}y_2)(x_1 + \sqrt{n}y_1)(x_2 + \sqrt{n}y_2) \\ &= (x_1x_2 + ny_1y_2 - \sqrt{n}(x_1y_2 + x_2y_1))(x_1x_2 + ny_1y_2 + \sqrt{n}(x_1y_2 + x_2y_1)) \\ &= (x_1x_2 + ny_1y_2)^2 - n(x_1y_2 + x_2y_1)^2 \\ &= x_3^2 - ny_3^2 \end{aligned}$$

pa je i par (x_3, y_3) rješenje Pellove jednadžbe $x^2 - ny^2 = 1$. □

Primjer 35. Iz rješenja $(3, 2)$ redom primjenom prethodnog pravila dolazimo do rješenja $(17, 12), (99, 70)$ Pellove jednadžbe $x^2 - 2y^2 = 1$.

Vrijedi i mnogo više od prethodno pokazanog, naime svako rješenje Pellove jednadžbe možemo dobiti na opisani način iz najmanjeg rješenja u prirodnim brojevima:

Teorem 6.2.2. *Neka je s (x_1, y_1) označeno najmanje rješenje u prirodnim brojevima Pellove jednadžbe $x^2 - ny^2 = 1$. Ako je (x_2, y_2) neko rješenje iste Pellove jednadžbe u prirodnim brojevima, tada postoji m $\in \mathbb{N}$ takav da je $x_2 + \sqrt{ny_2} = (x_1 + \sqrt{ny_1})^m$.*

Dokaz. Pretpostavimo da postoji rješenje (x_2, y_2) koje nije oblika $(x_1 + \sqrt{ny_1})^m$, za $m \in \mathbb{N}$. Kako je $x_1 + \sqrt{ny_1} > 1$ i $x_2 + \sqrt{ny_2} > 1$, postoji $k \in \mathbb{N}$ za koji vrijedi

$$(x_1 + \sqrt{ny_1})^k < x_2 + \sqrt{ny_2} < (x_1 + \sqrt{ny_1})^{k+1}.$$

Množenjem s $(x_1 - \sqrt{ny_1})^k$ dobivamo

$$1 < (x_2 + \sqrt{ny_2})(x_1 - \sqrt{ny_1})^k < x_1 + \sqrt{ny_1}.$$

Definirajmo cijele brojeve x_3, y_3 s $x_3 + \sqrt{n}y_3 = (x_2 + \sqrt{n}y_2)(x_1 - \sqrt{n}y_1)^k$.

Odatle slijedi i $x_3^2 - ny_3^2 = (x_2^2 - ny_2^2)(x_1^2 - ny_1^2)^k = 1$.

Iz $1 < x_3 + \sqrt{n}y_3$ slijedi i $0 < x_3 - \sqrt{n}y_3 < 1$ pa je $2x_3 > 1$ i $2\sqrt{n}y_3 > 0$. Prema tome, (x_3, y_3) je rješenje Pellove jednadžbe $x^2 - ny^2 = 1$ u prirodnim brojevima, koje je manje od rješenja (x_1, y_1) što nije moguće. \square

6.3 Određivanje rješenja Pellove jednadžbe

Netrivijalna rješenja Pellove jednadžbe $x^2 - ny^2 = 1$ se najlakše mogu odrediti korištenjem razvoja iracionalnog broja \sqrt{n} u jednostavni verižni razlomak. Iracionalnost broja \sqrt{n} implicira kako ovaj razvoj nije konačan, ali vidjet ćemo da ima vrlo poseban oblik.

Za beskonačni verižni razlomak $[a_1, a_2, \dots]$ kažemo da je *periodski* ako postoje prirodni brojevi k i m takvi da je $a_{m+n} = a_n$ za sve $n \geq k$. Najmanji takav broj m nazivamo *periodom* verižnog razlomka $[a_1, a_2, \dots]$ te pišemo

$$[a_1, a_2, \dots] = [a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \overline{a_k, a_{k+1}, \dots, a_{k+m-1}}].$$

Prema Primjeru 6, možemo pisati $\sqrt{2} = [1, \overline{2}]$.

Iskažimo postupak za određivanje razvoja u jednostavni verižni razlomak broja \sqrt{n} :

- Najprije stavimo $a_1 = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$, te neka je zatim $s_1 = a_1$ i $t_1 = n - s_1^2$.
- U idućem koraku stavimo $\alpha_1 = \frac{s_1 + \sqrt{n}}{t_1}$.
- U svakom od narednih koraka uzimamo $a_i = \lfloor \alpha_{i-1} \rfloor$, $s_i = a_i t_{i-1} - s_{i-1}$ te $t_i = \frac{n - s_i^2}{t_{i-1}}$.
- Nakon toga, neka je $\alpha_i = \frac{s_i + \sqrt{n}}{t_i}$.

Iz relacije $s_i = a_i t_{i-1} - s_{i-1}$ i $t_i = \frac{n - s_i^2}{t_{i-1}} = \frac{n - s_{i-1}^2}{t_{i-1}} + 2a_i s_{i-1} - a_i^2 t_{i-1}$ induktivno slijedi da su s_i, t_i nenegativni cijeli brojevi te da je $t_i \neq 0$.

U svakom koraku vrijedi

$$\alpha_{i-1} - a_i = \frac{s_{i-1} + \sqrt{n} - a_i t_{i-1}}{t_{i-1}} = \frac{\sqrt{n} - s_i}{t_{i-1}} = \frac{n - s_i^2}{t_{i-1}(\sqrt{n} + s_i)} = \frac{t_i}{\sqrt{n} + s_i} = \frac{1}{\alpha_i}.$$

Dakle, s $[a_1, a_2, \dots]$ je dan razvoj broja \sqrt{n} u jednostavni verižni razlomak.

Primijetimo da je razvoj periodičan ako postoje prirodni brojevi i, j , $i \neq j$, takvi da je $(s_i, t_i) = (s_j, t_j)$. Može se pokazati kako vrijedi nejednakost $t_i < s_i + \sqrt{n} < 2\sqrt{n}$, iz koje slijedi kako brojevi s_i, t_i mogu poprimiti samo konačno mnogo vrijednosti, čime dobivamo idući rezultat:

Propozicija 6.3.1. *Ako je n prirodan broj koji nije potpun kvadrat, tada je razvoj broja \sqrt{n} u jednostavni verižni razlomak periodski.*

Primjer 36. *Korištenjem prethodno opisanog postupka dobivamo $\sqrt{28} = [5, \overline{3, 2, 3, 10}]$.*

Situacija pokazana prethodnim primjerom nije slučajna. Naime, ako je n prirodan broj koji nije potpun kvadrat, tada iracionalni broj \sqrt{n} ima razvoj u jednostavni verižni razlomak oblika $[a_1, \overline{a_2, a_3, \dots, a_{m-1}, 2a_1}]$, gdje vrijedi $a_2 = a_{m-1}$, $a_3 = a_{m-2}$ itd.

Sada je prirodno postaviti pitanje kojeg su oblika iracionalni brojevi koji imaju periodski razvoj u jednostavni verižni razlomak. To pitanje ćemo riješiti narednom definicijom i rezultatom:

Definicija 6.3.2. Iracionalan broj α zovemo kvadratna iracionalnost ako je α korijen kvadratne jednadžbe s racionalnim koeficijentima.

Primjetimo da je kvadratna iracionalnost α oblika $\frac{a \pm \sqrt{b}}{c}$ za $c \neq 0$ i $b > 0$ koji nije potpun kvadrat.

Teorem 6.3.3 (Euler, Lagrange). Iracionalan broj α ima periodski razvoj u jednostavni verižni razlomak ako i samo ako je α kvadratna iracionalnost.

Dokaz. Periodičnost zapisa slijedi na isti način kao i u opisanom slučaju razvoja drugog korijena iz prirodnog broja koji nije potpun kvadrat. Pojasnimo sada i vezu periodskih zapisa s kvadratnim iracionalnostima.

Neka je $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_k, \overline{a_{k+1}, \dots, a_{k+m-1}}]$ razvoj iracionalnog broja α u periodski verižni razlomak. Pokažimo da je α kvadratna iracionalnost. Neka je najprije $\beta = [\overline{a_{k+1}, \dots, a_{k+m-1}}]$. Tada vrijedi

$$\beta = a_{k+1} + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_{k+m-1} + \frac{1}{\beta}}},$$

odakle dobivamo da postoje cijeli brojevi a, b, a', b' takvi da je

$$\beta = \frac{a\beta + b}{a'\beta + b'},$$

što daje i kvadratnu jednadžbu za β . Prema tome, β je kvadratna iracionalnost te je oblika $\beta = \frac{c + \sqrt{d}}{e}$. Kako je $\alpha = [a_1, a_2, \dots, a_k, \beta]$, direktno slijedi da je i α također kvadratna iracionalnost, tj. da je α također oblika $\frac{c' + \sqrt{d'}}{e'}$ za prirodan broj d' koji nije potpun kvadrat. \square

Idućim teoremom su potpuno određena rješenja Pellove jednadžbe:

Teorem 6.3.4. Sva rješenja u prirodnim brojevima jednadžbe $x^2 - ny^2 = 1$ nalaze se među $x = p_i$, $y = q_i$, gdje su $\frac{p_i}{q_i}$ parcijalne konvergentne u razvoju broja \sqrt{n} u jednostavni verižni razlomak. Prirodan broj $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ se smatra nultom konvergentnom te se shodno tome uzima $p_0 = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ i $q_0 = 1$. Neka je m duljina perioda u razvoju od \sqrt{n} . Ako je m paran, tada su rješenja dana s $x = p_{mk-1}$, $y = q_{mk-1}$, za $k \in \mathbb{N}$. Ako je m neparan, tada su rješenja dana s $x = p_{mk-1}$, $y = q_{mk-1}$, za paran $k \in \mathbb{N}$.

Primjer 37. Najmanje rješenje u prirodnim brojevima Pellove jednadžbe $x^2 - 28y^2 = 1$ je dano s $x = p_3 = 127$, $y = q_3 = 24$, jer je

$$\frac{p_3}{q_3} = 5 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}} = 5 + \frac{1}{3 + \frac{3}{7}} = 5 + \frac{7}{24} = \frac{127}{24}.$$

Bibliografija

- [1] T. Andreescu, D. Andrica: *An Introduction to Diophantine Equations*; Gil Publishing House, 2002
- [2] S. Bingulac, I. Matić: *Kineski teorem o ostacima za polinome*; Osječki matematički list, 14(2012), 34–55
- [3] D.M. Burton: *The History of Mathematics: An Introduction*; McGraw-Hill Primis, 2006
- [4] B. Dakić: *Arhimedov problem stoke*; Matematika i Škola, 51(2009), 34–37
- [5] A. Dujella: *Uvod u teoriju brojeva*; skripta, PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2003
- [6] H. M. Edwards: *Fermat's Last Theorem*; Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1977
- [7] G. A. Jones, J. M. Jones: *Elementary Number Theory*; Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, London, 2003
- [8] N. Koblitz: *A Course in Number Theory and Cryptography*; Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1994
- [9] I. Matić, D. Ševerdija: *Grčko-kineski stil u teoriji brojeva*; Osječki matematički list, 10(2010), 43–58
- [10] G. Savin: *Numbers, Groups and Cryptography*; skripta, Department of Mathematics, University of Utah, 2009
- [11] J. Stillwell: *Elements of Number Theory*; Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 2003
- [12] J. Stillwell: *Mathematics and Its History*; Springer-Verlag, New York, 2002